

## MONOGRAPHIE DE PRODUIT

Pr **POMALYST**<sup>®</sup>

pomalidomide

capsules de 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg

Agent antinéoplasique  
Agent immunomodulateur

Celgene Inc.  
6755 Mississauga Road  
Suite 600  
Mississauga, ON  
L5N 7Y2

Date de préparation :  
21 août 2019

Numéro de contrôle de la présentation : 229243

© 2019 Celgene Corporation.

<sup>®</sup>POMALYST est une marque déposée de Celgene Corporation.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ .....</b>	<b>3</b>
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT .....	3
INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE .....	3
CONTRE-INDICATIONS .....	4
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS .....	5
RÉACTIONS INDÉSIRABLES .....	14
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES .....	27
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION.....	29
SURDOSAGE.....	33
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE.....	33
CONSERVATION ET STABILITÉ.....	37
INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION .....	37
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....	38
<b>PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES .....</b>	<b>39</b>
RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES.....	39
ESSAIS CLINIQUES.....	39
PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE.....	55
TOXICOLOGIE.....	56
RÉFÉRENCES.....	60
<b>PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR.....</b>	<b>63</b>

# PrPOMALYST®

pomalidomide

## PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

### RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie d'administration	Forme posologique / teneur	Ingrédients non médicinaux cliniquement importants
Orale	Capsules, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	L'enveloppe des capsules renferme de la gélatine Mannitol <i>Pour obtenir une liste complète, veuillez consulter la section Formes posologiques, composition et conditionnement.</i>

### INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

- POMALYST® (pomalidomide) en association avec la dexaméthasone (dex) et le bortézomib est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple (MM) ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur comprenant de la lénalidomide.
- POMALYST® en association avec la dexaméthasone est indiqué pour les patients atteints de myélome multiple chez qui le bortézomib et la lénalidomide ont échoué, qui ont déjà reçu au moins deux formes de traitement et dont la maladie a progressé lors du plus récent traitement.

#### Distribution restreinte

POMALYST® n'est offert que par l'entremise d'un programme de distribution contrôlée appelé RevAid®. En vertu de ce programme, seuls les prescripteurs et pharmaciens inscrits au programme peuvent prescrire et servir le produit. De plus, POMALYST® ne peut être servi qu'aux patients inscrits au programme RevAid® et qui répondent à tous ses critères d'admissibilité. Veuillez composer le 1 888 RevAid1 (1 888 738-2431) ou vous rendre à l'adresse [www.RevAid.ca](http://www.RevAid.ca).

#### Gériatrie (patients > 65 ans) :

Il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie de POMALYST® en fonction de l'âge.

L'administration concomitante de la dexaméthasone peut accroître le risque d'infection, particulièrement de pneumonie, chez les patients de > 65 ans traités par POMALYST®. Il peut être nécessaire de réduire ou d'interrompre l'administration de la dexaméthasone chez ces patients en cas d'infection.

On dispose de données limitées sur l'innocuité de POMALYST® en association avec la dexaméthasone chez les patients de > 75 ans (voir **ESSAIS CLINIQUES**). Il faut réduire de moitié la dose concomitante de dexaméthasone chez les patients > 75 ans (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).

### **Pédiatrie (patients < 18 ans) :**

L'innocuité et l'efficacité de POMALYST® chez les enfants et les adolescents n'ont pas été établies.

### **CONTRE-INDICATIONS**

- POMALYST® (pomalidomide) est contre-indiqué chez les patients qui manifestent une hypersensibilité à ce produit, à la thalidomide, à la lénalidomide ou à n'importe lequel des ingrédients de la préparation ou des composants de son contenant. Pour une liste complète, voir **FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT**.
- POMALYST® est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou qui pourraient le devenir (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**). La pomalidomide est structurellement apparentée à la thalidomide, un agent avéré tératogène pour l'être humain et qui provoque des anomalies congénitales graves, voire potentiellement fatales. Chez les rats et les lapins, la pomalidomide a induit des malformations semblables à celles décrites avec la thalidomide. Si POMALYST® est pris durant la grossesse, il peut provoquer de graves anomalies congénitales ou la mort du fœtus (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**). Les femmes fertiles peuvent être traitées au moyen de POMALYST® à la condition d'adopter une contraception appropriée, en utilisant simultanément deux méthodes de contraception efficaces pour prévenir toute exposition fœtale au médicament. Le choix des deux méthodes contraceptives efficaces simultanées reposera sur une discussion concernant les risques et les avantages entre la patiente et un médecin qualifié, qui connaît l'utilisation des méthodes contraceptives (voir l'encadré **Mises en garde et précautions importantes**).
- Femmes qui allaitent.

Patients de sexe masculin qui sont incapables de suivre ou de respecter les mesures contraceptives requises (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières – Patients de sexe masculin**).

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### Mises en garde et précautions importantes

POMALYST® (pomalidomide) doit être administré sous la supervision d'un médecin qualifié, qui connaît bien l'utilisation des agents antinéoplasiques.

- Risque d'anomalies congénitales, de mortinatalité et d'avortement spontané chez l'être humain (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières : Femmes fertiles et Patients de sexe masculin**).
- Neutropénie et thrombocytopénie (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hématologie et EFFETS INDÉSIRABLES et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).
- Infections, y compris des cas fatals (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Infection**).
- Thrombose veineuse profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP) (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Appareil cardiovasculaire**).
- Hépatotoxicité, y compris des cas fatals (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hépatologie**).
- Anaphylaxie (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système immunitaire**).
- Des cas de réactivation de l'hépatite B, dont certains fatals, ont été signalés rarement chez des patients traités par POMALYST® en association avec la dexaméthasone qui avaient déjà été infectés par le virus de l'hépatite B (VHB) (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Infection**).
- Réactions dermatologiques graves, incluant le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell, ainsi que le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (ou DRESS pour drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), y compris des cas fatals (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Peau**).
- Syndrome de lyse tumorale (SLT), y compris des cas fatals (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Syndrome de lyse tumorale**).
- Offert uniquement en vertu d'un programme de distribution contrôlée appelé RevAid®.

### Généralités

Il faut informer les patients de s'abstenir de donner du sang lorsqu'ils prennent POMALYST® et pendant au moins quatre semaines après l'arrêt de POMALYST®. Si une femme enceinte recevait leur sang, son bébé pourrait être exposé à POMALYST® et naître avec des anomalies congénitales.

Il faut informer les patients de ne partager ce médicament avec personne d'autre et de retourner toutes les capsules inutilisées au programme RevAid® à la fin du traitement.

Il faut consulter la monographie de produit du bortézomib lorsque celui-ci est administré en association avec POMALYST® et la dexaméthasone avant d'instaurer le traitement.

Un taux de mortalité plus élevé a été observé lors des essais cliniques chez les patients atteints de myélome multiple lorsque du pembrolizumab a été ajouté à un traitement par dexaméthasone et un analogue de la thalidomide.

### **Appareil cardiovasculaire**

Les patients qui présentaient une dysfonction cardiaque significative (insuffisance cardiaque congestive [Classe III ou IV de la NY Heart Association], infarctus du myocarde dans les 12 mois précédant le début de l'étude, angine de poitrine instable ou mal maîtrisée) ont été exclus des études cliniques sur POMALYST®. Il faut faire montre d'une prudence appropriée lorsque l'on envisage un traitement par POMALYST® chez ces patients.

Des cas de fibrillation auriculaire ont été signalés, principalement chez des patients atteints d'une maladie cardiaque préexistante ou présentant des facteurs de risque cardiaques.

**Événements thromboemboliques :** L'utilisation de POMALYST® en association avec la dexaméthasone ± le bortézomib pour le traitement du MM s'accompagne d'un accroissement du risque d'événements thromboemboliques veineux (ÉTV), comme la thrombose veineuse profonde (TVP) et l'embolie pulmonaire (EP) (voir **RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Réactions indésirables au médicament lors des essais cliniques**).

Les antécédents d'événements thromboemboliques ou la prise concomitante d'agents érythropoïétiques ou d'autres agents, comme l'hormonothérapie substitutive, peuvent aussi accroître le risque thrombotique. Par conséquent, il faut utiliser ces agents avec prudence chez les patients atteints de MM traités au moyen de POMALYST® en association avec la dexaméthasone ± le bortézomib. L'utilisation des contraceptifs hormonaux est associée à un accroissement du risque de troubles thromboemboliques. Les contraceptifs hormonaux ne sont pas recommandés (voir **Populations particulières, Femmes fertiles**).

Les médicaments antithrombotiques prophylactiques, comme l'aspirine à faible dose, les héparines de bas poids moléculaire ou la warfarine, sont à recommander.

### **Cancérogénèse et mutagenèse**

Aucune étude sur le potentiel cancérigène de la pomalidomide n'a été réalisée chez les souris et les rats. Un singe sur douze ayant reçu 1 mg/kg de pomalidomide (une exposition représentant environ 15 fois l'exposition chez les patients à la dose recommandée de 4 mg/jour) a présenté une leucémie myéloïde aiguë lors d'une étude de toxicologie sur l'administration de doses répétées d'une durée de neuf mois.

La pomalidomide ne s'est pas révélée mutagène ni clastogène lors d'une batterie de tests, y compris le test de mutation inverse bactérien (test d'Ames), une analyse cytogénétique *in vitro* sur des lymphocytes de sang périphérique humain et le test du micronoyau chez des rats traités au moyen de doses allant jusqu'à 2 000 mg/kg/jour par voie orale (voir **TOXICOLOGIE**).

**Seconds cancers primitifs** : On a signalé des cas de seconds cancers primitifs (SCP), y compris de cancers de la peau non mélaniques, chez des patients traités par pomalidomide. La portée clinique de ces observations reste à définir. Les médecins doivent évaluer avec soin les patients avant et durant le traitement en appliquant les tests de dépistage du cancer standard pour surveiller l'apparition de SCP et instaurer le traitement indiqué.

### **Hématologie**

On a signalé des baisses des numérations sanguines, y compris des cas de neutropénie, d'anémie ou de thrombocytopénie, y compris de grade 3 ou 4, en lien avec l'utilisation clinique de POMALYST® en association avec la dexaméthasone ± le bortézomib.

On surveillera l'apparition de toxicités hématologiques chez les patients, surtout la neutropénie et la thrombocytopénie. Il faut informer les patients de signaler rapidement tout épisode fébrile. Il faut procéder à des formules sanguines complètes toutes les semaines pendant les huit premières semaines et tous les mois par la suite (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et analyses de laboratoire**). Les patients peuvent avoir besoin d'une interruption et/ou d'une modification de leur dose. Les patients peuvent aussi avoir besoin de traitements de soutien au moyen de produits sanguins et/ou de facteurs de croissance (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**). On conseille aux patients et aux médecins de rester à l'affût de tout signe et symptôme de saignement, y compris d'épistaxis, surtout s'il y a prise concomitante de médicaments susceptibles de provoquer des saignements.

### **Hépatologie**

Des cas d'insuffisance hépatique, y compris des cas graves et fatals et des taux nettement élevés d'alanine aminotransférase et de bilirubine (grade  $\geq 3$ ) ont été observés chez des patients des essais cliniques traités par POMALYST® (voir **RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Réactions indésirables au médicament déterminées à la suite de la surveillance après commercialisation**). Des cas d'hépatite ayant entraîné l'arrêt de la pomalidomide ont aussi été signalés. Il est recommandé de surveiller régulièrement la fonction hépatique de tous les patients (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES, Surveillance et analyses de laboratoire** et **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**).

### **Système immunitaire**

L'innocuité de POMALYST® chez des patients qui ont besoin d'autres traitements immunosuppresseurs (par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et le lupus) n'a pas été établie. On n'a pas non plus établi s'il est sécuritaire d'amorcer un traitement par POMALYST® chez les patients qui souffrent d'hépatite A, B ou C évolutive. Pour réduire le risque d'infection grave, il faut éviter de traiter ces patients au moyen de POMALYST®, si possible.

Des réactions d'hypersensibilité (p. ex., angioedème, anaphylaxie, urticaire) ont été signalées (voir **RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Réactions indésirables au médicament déterminées à la suite de la surveillance après commercialisation**). Certains cas se sont révélés graves et

sérieux, ont nécessité une intervention médicale immédiate et ont entraîné l'arrêt définitif de POMALYST®. Les patients qui avaient des antécédents de réactions allergiques à la thalidomide ou à la lénalidomide ont été exclus des études cliniques sur la pomalidomide et pourraient être plus sujets à des réactions d'hypersensibilité; POMALYST® est contre-indiqué chez ces patients (voir **CONTRE-INDICATIONS**). La suspension ou l'arrêt de la pomalidomide est à envisager en présence d'une éruption cutanée de grade 2-3; et le traitement ne doit être repris que si les bienfaits escomptés ne surclassent les risques potentiels. La pomalidomide doit être cessée définitivement en présence d'angioedème, d'anaphylaxie et d'érythème cutané de grade 4 (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Modification ou interruption de dose**).

### **Infection**

Des cas d'infection ont été fatals (grade 5) chez 11 (4,0 %) sujets dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib ainsi que chez 3 (1,1 %) sujets du groupe sous dexaméthasone et bortézomib (la durée globale médiane du traitement a différé entre les groupes de traitement, ce qu'il faut prendre en compte).

Des cas de réactivation de l'hépatite B, dont certains fatals, ont été signalés rarement chez des patients traités par POMALYST® en association avec la dexaméthasone qui avaient déjà été infectés par le virus de l'hépatite B (VHB). Certains de ces cas ont progressé jusqu'à une insuffisance hépatique aiguë, ce qui a entraîné l'arrêt de POMALYST®. La prudence s'impose lorsque POMALYST® en association avec la dexaméthasone est utilisé chez des patients ayant déjà été infectés par le VHB. Chez ces patients, il faut surveiller étroitement l'apparition de signes ou symptômes d'hépatite B active tout au long du traitement. Voir **RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Réactions indésirables au médicament déterminées à la suite de la surveillance après commercialisation**.

### **Maladie pulmonaire interstitielle (MPI)**

Des cas de maladie pulmonaire interstitielle (MPI) et d'événements connexes, y compris des cas de pneumonite, ont été observés chez des patients des essais cliniques traités par pomalidomide. Il faut procéder à une évaluation soigneuse des patients affectés par le déclenchement soudain ou une aggravation inexplicée de symptômes pulmonaires afin d'exclure la MPI. La pomalidomide doit être suspendue pendant la vérification de ces symptômes et, si la MPI est confirmée, il faut instaurer le traitement approprié. On ne reprendra le traitement par pomalidomide qu'après une évaluation approfondie des bienfaits et des risques. Voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et analyses de laboratoire, RÉACTIONS INDÉSIRABLES, Réactions indésirables au médicament déterminées à la suite de la surveillance après commercialisation et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Modification ou interruption de dose**.



## **Système nerveux**

On a signalé des cas de confusion, de fatigue, d'altération du niveau de conscience et d'étourdissements avec l'utilisation de POMALYST®. Il faut informer les patients d'un affaiblissement possible de leurs facultés mentales et/ou physiques lors de tâches délicates, comme la conduite automobile ou le maniement d'une machinerie complexe ou dangereuse.

Les patients qui souffrent d'une neuropathie périphérique de grade  $\geq 2$  permanente ont été exclus des études cliniques sur POMALYST®. Il faut faire montre d'une prudence appropriée lorsque l'on envisage un traitement par POMALYST® chez ces patients.

## **Peau**

De graves réactions dermatologiques, incluant le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell, ainsi que le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (ou DRESS pour drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) incluant des cas fatals, ont été signalées. Le syndrome DRESS peut se manifester par une réaction cutanée (comme un érythème ou une dermatite exfoliative), de l'éosinophilie, de la fièvre et/ou une lymphadénopathie avec des complications systémiques, telles que l'hépatite, la néphrite, la pneumonite, la myocardite et/ou la péricardite.

Si l'érythème cutané prend une forme exfoliative, purpurique ou bulleuse, ou si on soupçonne un syndrome de Stevens-Johnson, un syndrome de Lyell ou un syndrome DRESS, il faut cesser définitivement POMALYST® (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Modification ou interruption de dose**).

## **Syndrome de lyse tumorale**

Le syndrome de lyse tumorale (SLT) peut survenir chez les patients traités par POMALYST®. **Certains cas de SLT ont été fatals.** Les patients à risque à l'égard du SLT sont ceux qui avaient un lourd fardeau tumoral avant le traitement. Ces patients doivent faire l'objet d'une surveillance étroite et les précautions appropriées s'imposent.

## **Populations particulières**

### **1. Femmes fertiles :**

Sont considérées fertiles toutes les femmes qui ont leurs règles, qui ont été rendues aménorrhéiques par des traitements antérieurs et/ou qui sont périménopausées.

La pomalidomide est un analogue de la thalidomide, un agent avéré tératogène chez l'être humain, qui cause des anomalies congénitales graves et à potentiel fatal. Des études sur le développement embryofœtal chez des rats et des lapins indiquent que la pomalidomide a entraîné, chez les rejetons de rates et de lapines à qui le médicament avait été administré pendant la gestation, des malformations semblables aux anomalies congénitales observées chez l'être humain après une exposition à la thalidomide durant la grossesse. L'effet tératogène de la pomalidomide chez l'être humain ne peut être écarté. POMALYST® peut causer du tort au bébé à naître lorsqu'il est administré à une femme enceinte.

Chez les femmes fertiles, POMALYST® est contre-indiqué à moins que **TOUTES** les conditions suivantes ne soient réunies :

- ✓ La patiente est capable de comprendre et de respecter à la lettre les instructions. (Dans certains cas, il faudra recourir à un aidant apte pour veiller au respect des consignes du programme RevAid®).
- ✓ La patiente accepte d'utiliser simultanément les **deux** méthodes contraceptives efficaces obligatoires et est apte à le faire, ou elle s'engage à s'abstenir de tout rapport hétérosexuel.
- ✓ La patiente consulte un professionnel de la santé qui connaît bien la contraception pour discuter des **deux** meilleures méthodes contraceptives les plus efficaces à utiliser simultanément.
- ✓ La patiente comprend les risques cumulatifs de thrombose veineuse profonde associée, entre autres, mais sans s'y limiter, à POMALYST®, à la dexaméthasone, au cancer et à la contraception hormonale.
- ✓ La patiente connaît le risque d'échec de la contraception.
- ✓ La patiente accepte de se conformer aux exigences en matière de tests de grossesse décrites en détail ci-dessous et est apte à le faire. Cela inclut deux tests de grossesse négatifs avant la première remise du médicament et d'autres tests de grossesse pendant toute la durée du traitement.
- ✓ La patiente est informée de la nécessité potentielle d'une contraception d'urgence.
- ✓ La patiente est informée du risque de tératogénicité en cas de grossesse.
- ✓ La patiente connaît et comprend la nécessité de consulter immédiatement son médecin s'il y a un risque de grossesse.
- ✓ La patiente reconnaît l'importance de se conformer à toutes les conditions d'utilisation.

### **Méthodes contraceptives :**

- Toutes les femmes fertiles (y compris celles qui normalement n'utilisent pas de contraception parce qu'elles ont des antécédents d'infertilité ou qu'elles sont aménorrhéiques) doivent utiliser simultanément les deux méthodes de contraception efficaces :
  - pendant au moins quatre semaines avant le début du traitement par POMALYST®;
  - pendant les interruptions de traitement;
  - pendant le traitement par POMALYST®;
  - et pendant au moins quatre semaines après l'arrêt du traitement par POMALYST®.
- La patiente qui choisit de s'abstenir de tout rapport hétérosexuel comme mesure contraceptive doit s'engager à utiliser simultanément deux méthodes de contraception si l'abstinence est levée.
- L'utilisation des contraceptifs hormonaux est associée à un accroissement du risque de troubles thromboemboliques. Les contraceptifs hormonaux ne sont pas recommandés (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Appareil cardiovasculaire**).

- Toute méthode contraceptive peut échouer. Par conséquent, les femmes fertiles doivent donc impérativement utiliser simultanément deux méthodes de contraception efficaces.
- En cas de grossesse durant le traitement, le médicament doit être immédiatement cessé. Dans ces conditions, la patiente doit être adressée à un obstétricien-gynécologue qui connaît bien les problèmes de toxicité reproductive, pour une évaluation et une guidance plus approfondies.
- Toute exposition embryofœtale possible à POMALYST® doit être signalée immédiatement par téléphone à Celgene, au numéro 1 888 RevAid1 (1 888 738-2431).
- Les patientes qui ont déjà subi une hystérectomie ou une ovariectomie bilatérale sont exemptées de l'obligation d'utiliser la contraception durant le traitement par POMALYST®.

### **Tests de grossesse :**

- Les patientes fertiles ne doivent pas recevoir POMALYST® tant que toute grossesse n'a pas été exclue. Elles doivent avoir des résultats négatifs à deux tests de grossesse avant d'amorcer un traitement par POMALYST® et aux tests subséquents tout au long du traitement.
- Le premier test de grossesse doit être réalisé de sept à 14 jours avant le début du traitement.
- Le deuxième test de grossesse doit être réalisé 24 heures avant de servir le médicament et de débiter le traitement.
- Un test de grossesse doit être réalisé toutes les semaines durant le premier mois de traitement, puis une fois par mois durant le traitement (ou toutes les deux semaines si les menstruations sont irrégulières) et quatre semaines après l'arrêt du traitement.
- Il s'agit de tests de grossesse sanguins qui doivent être effectués par un laboratoire autorisé. Les dates et les résultats des tests de grossesse doivent être consignés au dossier.
- Les tests de grossesse doivent avoir une sensibilité à détecter une concentration d'hCG sérique d'au moins 25 mUI/mL.
- Un test de grossesse et une consultation en obstétrique-gynécologie s'imposent si une patiente n'a pas ses règles ou si elle manifeste des saignements menstruels anormaux.

### **2. Femmes enceintes :**

- POMALYST® est contre-indiqué chez les femmes qui sont enceintes ou qui peuvent le devenir.
- POMALYST® est contre-indiqué chez les femmes fertiles qui n'utilisent pas simultanément les deux méthodes contraceptives efficaces obligatoires ou qui ne s'abstiennent pas de tout rapport hétérosexuel.
- En cas de grossesse durant le traitement, le médicament doit être immédiatement cessé. Dans ces conditions, la patiente doit être adressée à un obstétricien-gynécologue qui connaît bien les problèmes de toxicité reproductive pour une évaluation et une guidance plus approfondies.

- Toute exposition embryofœtale possible à POMALYST® doit être signalée immédiatement par téléphone à Celgene, au numéro 1 888 RevAid1 (1 888 738-2431).

### 3. Femmes qui allaitent :

POMALYST® ne doit pas être utilisé durant l'allaitement (voir **CONTRE-INDICATIONS**).

L'innocuité de POMALYST® durant l'allaitement n'a pas été établie.

### 4. Patients de sexe masculin :

La pomalidomide est présente dans le sperme des patients qui reçoivent POMALYST® (voir **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique, Distribution**). Il existe un risque potentiel d'anomalies congénitales, de mortinatalité et d'avortement spontané si le fœtus est exposé à la pomalidomide présente dans le sperme d'un patient de sexe masculin (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Femmes fertiles**). Par conséquent, tout homme prenant POMALYST® doit utiliser un condom pendant tout rapport sexuel avec une femme fertile, même s'il a subi avec succès une vasectomie. L'homme doit utiliser le condom :

- pendant son traitement par POMALYST® ;
- pendant toute interruption de traitement; et
- pendant au moins quatre semaines après l'arrêt de POMALYST®.

Les patients ne doivent pas faire de dons de sperme pendant qu'ils prennent POMALYST® et pendant au moins quatre semaines après l'arrêt de POMALYST®.

Les patients de sexe masculin doivent informer leurs partenaires sexuelles fertiles de ce qui suit :

- ils prennent POMALYST® ;
- il y a un risque potentiel d'anomalies congénitales, de mortinatalité et d'avortement spontané si un fœtus est exposé au sperme du patient;
- un condom doit être porté lors de tout rapport sexuel.

Si une grossesse survenait chez la partenaire d'un patient de sexe masculin traité par pomalidomide, il faut adresser la partenaire à un médecin qui est spécialiste ou qui connaît bien la tératologie pour évaluation et guidance.

### 5. Patients souffrant d'insuffisance hépatique :

La pomalidomide est principalement métabolisée par le foie. Il faut éviter d'administrer POMALYST® aux patients qui présentent un taux de bilirubine sérique supérieur à 1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN) et des taux d'AST/ALT supérieurs à 3 fois la LSN. Après l'administration d'une simple dose, l'ASC de la pomalidomide a augmenté de 51 %, 58 % et 72 % chez les sujets présentant une légère insuffisance hépatique (classe A de Child-Pugh), modérée (classe B de Child-Pugh) et grave (classe C de Child-Pugh), comparativement aux sujets dont la fonction hépatique était normale. Un ajustement de la dose est recommandé chez les patients qui présentent une insuffisance hépatique (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION** et **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations et maladies particulières**).

## **6. Patients souffrant d'insuffisance rénale :**

La pomalidomide est largement métabolisée avant d'être excrétée. La pomalidomide et ses métabolites sont excrétés par les reins. Chez les patients qui souffrent d'insuffisance rénale grave nécessitant une dialyse, l'ASC de la pomalidomide a augmenté de 35,8 % et le taux d'EIG a augmenté par rapport aux patients qui avaient une fonction rénale normale; par conséquent, un ajustement de la dose de départ est recommandé chez ces patients. Pour les patients qui ont une insuffisance rénale grave nécessitant une dialyse, POMALYST® doit être administré après l'hémodialyse les jours de dialyse parce que l'exposition à la pomalidomide pourrait être significativement réduite durant la dialyse (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, SURDOSAGE et MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations et maladies particulières**).

## **7. Pédiatrie (patients < 18 ans) :**

L'innocuité et l'efficacité n'ont pas été établies chez les jeunes patients de moins de 18 ans (voir **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations et maladies particulières**).

Chez **TOUTES** les femmes fertiles sexuellement actives, l'utilisation simultanée de deux méthodes contraceptives efficaces est obligatoire.

## **8. Gériatrie (patients > 65 ans) :**

Il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie de POMALYST® en fonction de l'âge.

Pour les patients qui ont plus de 75 ans, il faut réduire de moitié la dose de départ de dexaméthasone (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).

L'administration concomitante de la dexaméthasone peut accroître le risque d'infection, particulièrement de pneumonie, chez les patients de > 65 ans traités par POMALYST®. Il peut être nécessaire de réduire ou d'interrompre l'administration de la dexaméthasone chez ces patients en cas d'infection.

Dans l'étude de phase III évaluant l'association de POMALYST® et de dexaméthasone (schéma Pd), 45 % des patients étaient âgés de > 65 ans et 8 % étaient âgés de > 75 ans dans le groupe recevant le traitement Pd (n = 302). Dans l'étude de phase III évaluant l'association de POMALYST®, de dexaméthasone et de bortézomib, 56,2 % des patients étaient âgés de > 65 ans et 16,4 % étaient âgés de > 75 ans dans le groupe recevant l'association de POMALYST®, de dexaméthasone et de bortézomib (n = 281).

### **Surveillance et analyses de laboratoire**

On surveillera l'apparition de toxicités hématologiques chez les patients, surtout la neutropénie et la thrombocytopénie. On procédera à une vérification hebdomadaire de la formule sanguine complète pendant les huit premières semaines et tous les mois par la suite. Chez les patients qui présentent des toxicités hématologiques, on peut devoir recourir à une interruption et/ou une modification de la dose et/ou à des produits sanguins et/ou des facteurs de croissance (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).

Il faut procéder à des tests de fonction hépatique, incluant la biochimie sanguine, dont l'aspartate aminotransférase (AST), l'alanine aminotransférase (ALT), la bilirubine directe et le temps de

prothrombine (RIN), et vérifier la fonction rénale, c'est-à-dire, la créatinine et la clairance de la créatinine, au départ et au début de chaque cycle de traitement.

Il faut procéder à une évaluation soigneuse des patients affectés par le déclenchement soudain ou une aggravation inexpliquée de symptômes pulmonaires afin d'exclure la MPI. Voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Maladie pulmonaire interstitielle (MPI) et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION.**

## **RÉACTIONS INDÉSIRABLES**

### **Réactions indésirables au médicament lors des essais cliniques**

*Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux des effets indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés en pratique et ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables à un médicament qui sont tirés d'essais cliniques s'avèrent utiles pour la détermination des événements indésirables liés aux médicaments et pour l'approximation des taux.*

### **POMALYST® en association avec la dexaméthasone et le bortézomib**

Lors de l'étude de phase III multicentrique, randomisée et ouverte, 548 patients souffrant de myélome multiple qui avaient reçu au moins un traitement antérieur, y compris la lénalidomide, ont été inclus dans la population servant à étudier l'innocuité : 278 dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib et 270 dans le groupe sous dexaméthasone et bortézomib. La durée globale médiane du traitement a différé entre les groupes de traitement, et il faut prendre cela en compte pour comparer les fréquences des réactions indésirables ainsi que les taux de mortalité au cours de la période de traitement entre les groupes de traitement. La durée médiane de traitement a été de 38,3 semaines (1,1 – 187,3 semaines) dans le groupe recevant POMALYST®, la dexaméthasone et le bortézomib comparativement à 21,4 semaines (0,4 – 164,4 semaines) dans le groupe témoin.

Dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib, les réactions indésirables les plus fréquentes entraînant l'interruption de l'administration de POMALYST® ont été la neutropénie (23 %), la thrombocytopénie (14 %) et la pneumonie (14 %); dans l'ensemble, la durée médiane avant la première interruption de l'administration de POMALYST® a été de 32 jours. Les réactions indésirables les plus fréquentes entraînant une réduction de la dose de POMALYST® ont été la neutropénie (10 %), suivie de la thrombocytopénie (9 %); dans l'ensemble, la durée médiane avant la première réduction de la dose de POMALYST® a été de 64,5 semaines. Les réactions indésirables les plus fréquentes entraînant l'interruption du traitement par POMALYST® ont été la fatigue (1 %), la neuropathie sensorielle périphérique et l'embolie pulmonaire (1 % dans chaque cas). Les réactions indésirables ont entraîné un abandon du traitement de l'étude chez 10,7 % des sujets du groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib ainsi que chez 17,6 % des sujets du groupe sous dexaméthasone et bortézomib.

Les réactions indésirables les plus fréquemment signalées dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib ( $\geq 20$  %, avec une fréquence supérieure de  $\geq 2$  % [n = 6] à celle dans le groupe recevant le traitement de comparaison) ont été la neuropathie sensorielle

périphérique, la neutropénie, la fatigue, la constipation, l'œdème périphérique, la diarrhée, l'infection des voies respiratoires supérieures, la toux et la dyspnée. Les réactions indésirables les plus fréquemment signalées de grade 3 ou 4 dans le groupe sous POMALYST<sup>®</sup>, dexaméthasone et bortézomib ( $\geq 5\%$ , avec une fréquence supérieure de  $\geq 1\%$  [ $n = 3$ ] à celle dans le groupe recevant le traitement de comparaison) ont été la neutropénie, la thrombocytopénie, la pneumonie, l'hyperglycémie, la fatigue, la neuropathie sensorielle périphérique, la diarrhée et l'hypokaliémie. Les réactions indésirables graves les plus fréquemment signalées dans le groupe sous POMALYST<sup>®</sup>, dexaméthasone et bortézomib ( $\geq 1\%$ , avec une fréquence supérieure de  $\geq 1\%$  à celle dans le groupe recevant le traitement de comparaison) ont été la pneumonie (9%), la pyrexie (4%), l'influenza, l'infection des voies respiratoires inférieures, la fibrillation auriculaire (3% dans chaque cas), le choc septique, l'infection des voies respiratoires, le sepsis (2% dans chaque cas), la dyspnée et la mort (1% dans chaque cas).

Les réactions indésirables apparues sous traitement observées dans le groupe sous POMALYST<sup>®</sup>, dexaméthasone et bortézomib sont présentées dans le Tableau 1. Toutes les réactions indésirables observées chez  $\geq 5\%$  des patients ainsi que toutes les réactions indésirables de grade 3 ou 4 observées chez  $\geq 1\%$  des patients ont été incluses (des fréquences supérieures de  $\geq 2\%$  et de  $\geq 1\%$  à celles dans le groupe recevant le traitement de comparaison pour les réactions indésirables de tout grade et pour les réactions indésirables de grade 3 ou 4, respectivement, ont été appliquées).

**Tableau 1 : Réactions indésirables à l'association de POMALYST<sup>®</sup>, de dexaméthasone et de bortézomib (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III**

Classe de systèmes et d'organes/ Terme préféré	POMALYST <sup>®</sup> + dex + bortézomib (n = 278)		dex + bortézomib (n = 270)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
<b>Troubles des systèmes sanguin et lymphatique</b>	<b>187 (67)</b>	<b>154 (55)</b>	<b>143 (53)</b>	<b>112 (42)</b>
Neutropénie	130 (47)	116 (42)	29 (11)	23 (9)
Thrombocytopénie <sup>a</sup>	102 (37)	76 (27)	103 (38)	79 (29)
Anémie <sup>a</sup>	79 (28)	39 (14)	73 (27)	38 (14)
Leucopénie	32 (12)	15 (5)	9 (3)	5 (2)
Lymphopénie	12 (4)	12 (4)	9 (3)	8 (3)
Neutropénie fébrile	9 (3)	9 (3)	0	0
<b>Troubles cardiaques</b>	<b>63 (23)</b>	<b>22 (8)</b>	<b>37 (14)</b>	<b>12 (4)</b>
Fibrillation auriculaire	26 (9)	9 (3)	5 (2)	2 (0,7)
<b>Troubles oculaires</b>	<b>59 (21)</b>	<b>8 (3)</b>	<b>46 (17)</b>	<b>1 (0,4)</b>
Cataracte	10 (4)	3 (1)	0	0
<b>Troubles gastro-intestinaux</b>	<b>195 (70)</b>	<b>36 (13)</b>	<b>168 (62)</b>	<b>19 (7)</b>
Constipation	102 (37)	7 (3)	65 (24)	1 (0,4)
Diarrhée	94 (34)	20 (7)	81 (30)	9 (3)
Nausées <sup>a</sup>	49 (18)	1 (0,4)	54 (20)	1 (0,4)
Vomissements <sup>a</sup>	32 (12)	3 (1)	27 (10)	1 (0,4)
Douleurs abdominales	27 (10)	4 (1)	18 (7)	4 (2)
Douleur abdominale haute	22 (8)	1 (0,4)	15 (6)	0
Stomatite	17 (6)	1 (0,4)	1 (0,4)	0
Sécheresse de la bouche	16 (6)	0	10 (4)	0
Distension abdominale	15 (5)	1 (0,4)	6 (2)	0
<b>Troubles généraux et problèmes au point d'administration</b>	<b>213 (77)</b>	<b>50 (18)</b>	<b>172 (64)</b>	<b>31 (12)</b>
Fatigue	103 (37)	23 (8)	71 (26)	10 (4)
Œdème périphérique	94 (34)	5 (2)	54 (20)	2 (0,7)
Pyrexie	64 (23)	6 (2,2)	32 (12)	2 (0,7)
Douleur thoracique non cardiaque	14 (5)	4 (1)	13 (5)	1 (0,4)
Œdème	10 (4)	4 (1)	1 (0,4)	0



**Tableau 1 : Réactions indésirables à l'association de POMALYST<sup>®</sup>, de dexaméthasone et de bortézomib (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III (suite)**

Classe de systèmes et d'organes/ Terme préféré	POMALYST <sup>®</sup> + dex + bortézomib (n = 278)		dex + bortézomib (n = 270)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
<b>Lésions, intoxications et complications liées aux interventions</b>	<b>85 (31)</b>	<b>8 (3)</b>	<b>56 (21)</b>	<b>5 (2)</b>
Surdosage accidentel	23 (8)	7 (3)	5 (2)	3 (1)
Chute	17 (6)	1 (0,4)	10 (4)	0
<b>Infections et infestations</b>	<b>223 (80)</b>	<b>86 (31)</b>	<b>175 (65)</b>	<b>48 (18)</b>
Infection des voies respiratoires supérieures	58 (21)	3 (1)	48 (18)	3 (1)
Pneumonie	53 (19)	32 (12)	37 (14)	17 (6)
Bronchite	39 (14)	4 (1)	19 (7)	3 (1)
Infection virale des voies respiratoires supérieures	31 (11)	0	14 (5)	0
Grippe	27 (10)	7 (3)	15 (6)	4 (2)
Infection urinaire	27 (10)	4 (1)	25 (10)	1 (0,4)
Infection des voies respiratoires	23 (8)	4 (1)	12 (4)	0
Infection des voies respiratoires inférieures	22 (8)	4 (1)	7 (3)	2 (0,7)
Septicémie	6 (2)	6 (2)	1 (0,4)	1 (0,4)
Choc septique	6 (2)	4 (1)	0	0
Colite à Clostridium difficile	4 (1)	3 (1)	1 (0,4)	0
Infection pulmonaire	4 (1)	3 (1)	3 (1)	0
Bronchiolite	4 (1)	3 (1)	0	0
<b>Analyses de laboratoire</b>	<b>70 (25)</b>	<b>20 (7)</b>	<b>67 (25)</b>	<b>17 (6)</b>
Diminution du poids	16 (6)	3 (1)	17 (6)	0
<b>Troubles du métabolisme et de la nutrition</b>	<b>144 (52)</b>	<b>71 (26)</b>	<b>113 (42)</b>	<b>49 (18)</b>
Hypokaliémie	43 (16)	17 (6)	30 (11)	11 (4)
Hyperglycémie	40 (14)	25 (9)	30 (11)	14 (5)
Hypomagnésémie	19 (7)	5 (2)	7 (3)	2 (0,7)
Hypocalcémie	18 (7)	5 (2)	9 (3)	1 (0,4)
Hypophosphatémie	16 (6)	11 (4)	8 (3)	5 (2)

**Tableau 1 : Réactions indésirables à l'association de POMALYST<sup>®</sup>, de dexaméthasone et de bortézomib (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III (suite)**

Classe de systèmes et d'organes/ Terme préféré	POMALYST <sup>®</sup> + dex + bortézomib (n = 278)		dex + bortézomib (n = 270)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
Hyperkaliémie	11 (4)	7 (3)	6 (2)	2 (0,7)
Hypercalcémie	11 (4)	4 (1)	4 (2)	1 (0,4)
<b>Troubles musculosquelettiques et des tissus conjonctifs</b>	<b>171 (62)</b>	<b>17 (6)</b>	<b>119 (44)</b>	<b>14 (5)</b>
Douleur dorsale	52 (19)	3 (1)	36 (13)	4 (2)
Faiblesse musculaire	38 (14)	3 (1)	13 (5)	1 (0,4)
Spasmes musculaires	26 (9)	0	14 (5)	0
Douleurs osseuses	22 (8)	1 (0,4)	15 (6)	3 (1,1)
<b>Troubles du système nerveux</b>	<b>205 (74)</b>	<b>57 (21)</b>	<b>163 (60)</b>	<b>32 (12)</b>
Neuropathie sensorielle périphérique	133 (48)	23 (8)	100 (37)	12 (4)
Étourdissements	48 (17)	1 (0,4)	28 (10)	1 (0,4)
Tremblements	30 (11)	1 (0,4)	8 (3)	0
Dysgueusie	18 (7)	0	8 (3)	0
Syncope	17 (6)	14 (5)	11 (4)	6 (2)
Neuropathie sensorimotrice périphérique	16 (6)	5 (2)	12 (4)	1 (0,4)
Paresthésie	16 (6)	0	5 (2)	0
<b>Troubles psychiatriques</b>	<b>95 (34)</b>	<b>13 (5)</b>	<b>86 (32)</b>	<b>5 (2)</b>
Insomnie	45 (16)	5 (2)	53 (20)	2 (0,7)
Dépression	15 (5)	3 (1)	7 (3)	0
<b>Troubles rénaux et urinaires</b>	<b>52 (19)</b>	<b>19 (7)</b>	<b>28 (10)</b>	<b>6 (2)</b>
Lésion rénale aiguë	15 (5)	9 (3)	10 (4)	4 (2)
Néphropathie chronique	6 (2)	3 (1)	0	0
Rétention urinaire	4 (1)	3 (1)	0	0
<b>Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux</b>	<b>141 (51)</b>	<b>24 (9)</b>	<b>107 (40)</b>	<b>13 (5)</b>
Toux	57 (21)	0	40 (15)	0
Dyspnée	56 (20)	8 (3)	33 (12)	3 (1)
Embolie pulmonaire	11 (4)	11 (4)	1 (0,4)	1 (0,4)

**Tableau 1 : Réactions indésirables à l'association de POMALYST<sup>®</sup>, de dexaméthasone et de bortézomib (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III (suite)**

Classe de systèmes et d'organes/ Terme préféré	POMALYST <sup>®</sup> + dex + bortézomib (n = 278)		dex + bortézomib (n = 270)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
<b>Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés</b>	<b>91 (33)</b>	<b>9 (4)</b>	<b>59 (22)</b>	<b>0</b>
Éruptions cutanées	26 (9)	6 (2)	8 (3)	0
<b>Troubles vasculaires</b>	<b>79 (28)</b>	<b>17 (6)</b>	<b>52 (19)</b>	<b>8 (3)</b>
Hypotension	24 (9)	5 (2)	14 (5)	1 (0,4)
Hypertension	18 (7)	8 (3)	17 (6)	4 (2)
Thrombose veineuse profonde	14 (5)	2 (0,7)	5 (2)	1 (0,4)

<sup>a</sup>Réactions indésirables supplémentaires qui ne remplissaient pas les critères d'inclusion, mais qui ont été incluses en fonction de leur fréquence, de leur pertinence clinique et de leur observation comme réactions indésirables dans d'autres études sur POMALYST<sup>®</sup> et/ou dans le cadre de la surveillance après commercialisation.

Date limite de la collecte des données : 26 octobre 2017

**Réactions indésirables au médicament moins courantes lors des essais cliniques ( $\geq 1\%$  à  $< 5\%$ )**

Les réactions indésirables apparues sous traitement signalées chez  $\geq 1\%$  à  $< 5\%$  des patients dans le groupe sous POMALYST<sup>®</sup>, dexaméthasone et bortézomib, avec une fréquence supérieure de  $\geq 1\%$  à celle dans le groupe recevant le traitement de comparaison, et qui n'ont pas été décrites ailleurs sont les suivantes :

**Troubles de l'oreille et du labyrinthe** : acouphène, surdité

**Troubles oculaires** : hyperémie oculaire

**Troubles cardiaques** : insuffisance cardiaque, bradycardie

**Troubles gastro-intestinaux** : gêne abdominale, flatulences, gastrite

**Troubles généraux et problèmes au point d'administration** : syndrome pseudogrippal, dysphagie, maux de dents, gastrite

**Infections et infestations** : candidose orale, pharyngite, zona, sinusite, rhinite, infection oculaire, infection à virus respiratoire syncytial

**Lésions, intoxications et complications liées aux interventions** : fracture costale, plaie, réaction liée à la perfusion

**Analyses de laboratoire** : augmentation du poids, augmentation de l'alanine aminotransférase, augmentation de l'aspartate aminotransférase, augmentation du cholestérol sanguin, augmentation de la créatinine phosphokinase sanguine

**Troubles du métabolisme et de la nutrition** : baisse de l'appétit, diabète sucré, hyperphosphatémie, hyponatrémie, déshydratation

**Troubles musculosquelettiques et des tissus conjonctifs** : myalgie, douleur rachidienne,

douleur thoracique musculosquelettique, ostéonécrose de la mâchoire, inconfort dans les membres, fracture pathologique

**Néoplasies bénignes, malignes et non spécifiées (incluant kystes et polypes) :** carcinome basocellulaire (inclus puisque probablement lié à POMALYST®)

**Troubles du système nerveux :** neuropathie périphérique, agueusie, trouble de l'équilibre, inconfort à la tête

**Troubles psychiatriques :** altération de l'humeur, anxiété, agitation, délire

**Troubles rénaux et urinaires :** hématurie, dysurie, pollakiurie, anurie

**Troubles de l'appareil reproducteur et des seins :** douleur pelvienne

**Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux :** rhinorrhée, hoquet

**Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés :** hyperhidrose, enflure du visage, diaphorèse nocturne, ampoule, éruption cutanée maculeuse

**Troubles vasculaires :** embolie veineuse

### **Résultats anormaux aux analyses hématologiques et biochimiques**

Le Tableau 2 présente un sommaire de la proportion de patients ayant présenté des changements par rapport à leurs valeurs de départ en cours d'étude pour les paramètres hématologiques et biochimiques, soit une aggravation vers une anomalie de grade 3 ou 4, selon les critères CTCAE. Une différence de fréquence de > 1 % (n = 3) entre les deux groupes est appliquée.

**Tableau 2 : Détérioration des anomalies, à un grade 3 ou 4, par rapport aux valeurs de départ en cours d'étude selon les critères CTCAE**

Paramètre de laboratoire	POMALYST® + dex + bortézomib	dex + bortézomib
	Grade 3 ou 4 n (%)	Grade 3 ou 4 n <sup>a</sup> (%)
<b>Anomalie hématologique</b>	<b>n = 267</b>	<b>n = 267</b>
Lymphocytes	142 (51,4)	97 (36,5) <sup>a</sup>
Neutrophiles	120 (43,5)	22 (8,3) <sup>a</sup>
Leucocytes	91 (33)	22 (8,2)
Plaquettes	72 (26,1)	80 (30)
Hémoglobine	36 (13)	29 (11)
<b>Anomalie biochimique clinique</b>	<b>n = 267</b>	<b>n = 266</b>
Phosphate	60 (21,7)	46 (17,3)
Glucose	45 (16,2)	38 (14,3)
Potassium	32 (11,6)	22 (8,3)
Calcium	15 (5,4)	4 (1,5)
Calcium corrigé	14 (5,1)	4 (1,5)
Créatinine	10 (3,6)	5 (1,9)

<sup>a</sup>N = 266

Date limite de la collecte des données : 26 octobre 2017

## **POMALYST® en association avec la dexaméthasone**

Lors de l'étude de phase III multicentrique, randomisée, ouverte, 449 patients souffrant de myélome multiple récidivant et réfractaire ont été inclus dans la population servant à étudier l'innocuité : 300 dans le groupe sous pomalidomide plus dexaméthasone à faible dose (LD-dex) et 149 dans le groupe sous dexaméthasone à dose élevée (HD-dex).

Environ 24 % des sujets du groupe sous POMALYST®+dexaméthasone ont connu des réductions de leur dose de pomalidomide, la plupart en raison de troubles sanguins, dont neutropénie (7,7 %), thrombocytopénie (6,3 %) et neutropénie fébrile (1,3 %). Les interruptions de dose de pomalidomide ont été plus fréquentes (61,3 %) et ont été attribuables à la neutropénie (21,0 %), à la thrombocytopénie (8 %), à la pneumonie (4 %), à la neutropénie fébrile, à une détérioration de l'état de santé physique général et à la pyrexie (3,7 % chacune), à la fatigue (2,3 %) et à l'anémie (2 %).

Les réactions indésirables les plus fréquemment signalées chez les patients traités par POMALYST®+dexaméthasone concernaient des troubles des systèmes sanguin et lymphatique (anémie, neutropénie et thrombocytopénie), des troubles généraux et problèmes au point d'administration (fatigue, pyrexie et œdème périphérique) et des infections et infestations (pneumonie). Les réactions indésirables de grade 3 ou 4 les plus souvent signalées ont été : neutropénie, anémie, thrombocytopénie, pneumonie, fatigue, pyrexie et œdème périphérique. Les réactions indésirables graves les plus fréquemment signalées ont été la pneumonie et la neutropénie fébrile. D'autres réactions indésirables graves d'intérêt ont inclus : neutropénie, thrombocytopénie et événements thromboemboliques veineux.

Les réactions indésirables ont eu tendance à survenir plus souvent au cours des deux premiers cycles de traitement par POMALYST®.

Les réactions indésirables liées au traitement observées chez les patients sous POMALYST®+dexaméthasone sont énumérées au Tableau 3 ci-dessous par classe de systèmes et d'organes ainsi que selon leur fréquence, pour toutes les réactions indésirables survenues chez  $\geq 5$  % des patients et toutes les réactions indésirables de grade 3 ou 4 survenues chez  $\geq 1$  % des patients.

**Tableau 3 : Réactions indésirables à POMALYST®+dexaméthasone (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III**

Classe de système d'organe/ termes préférés <sup>a</sup>	POMALYST®+dex (n = 300)		HD-dex (n = 149)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
<b>Troubles des systèmes sanguin et lymphatique<sup>c</sup></b>				
Anémie	137 (46)	81 (27)	63 (42)	43 (29)
Neutropénie	136 (45)	125 (42)	29 (20)	22 (15)
Thrombocytopénie	81 (27)	62 (21)	40 (27)	36 (24)
Leucopénie	37 (12)	26 (9)	8 (5)	5 (3)
Neutropénie fébrile	20 (7)	20 (7)	0 (0)	0 (0)
Lymphopénie	13 (4)	11 (4)	8 (5)	6 (4)
<b>Troubles cardiaques</b>				
Fibrillation auriculaire	10 (3)	4 (1)	2 (1)	1 (< 1)
<b>Troubles de l'oreille et du labyrinthe</b>				
Vertiges	9 (3)	3 (1)	0 (0)	0 (0)
<b>Troubles gastro-intestinaux</b>				
Constipation	58 (19)	5 (2)	18 (12)	0 (0)
Diarrhée	55 (18)	3 (1)	24 (16)	2 (1)
Nausées	35 (12)	2 (1)	13 (9)	2 (1)
Vomissements	23 (8)	4 (1)	6 (4)	0 (0)
<b>Troubles généraux et problèmes au point d'administration</b>				
Fatigue	85 (28)	14 (5)	36 (24)	7 (5)
Pyrexie	63 (21)	9 (3)	29 (20)	4 (3)
Asthénie	41 (14)	10 (3)	24 (16)	9 (6)
Œdème périphérique	39 (13)	4 (1)	16 (11)	3 (2)
Détérioration de l'état de santé physique général	27 (9)	16 (5)	14 (9)	10 (7)
Douleur	7 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (< 1)
<b>Infections et infestations<sup>d</sup></b>				
Pneumonie	32 (11)	27 (9)	14 (9)	11 (7)
Infection des voies respiratoires supérieures	28 (9)	3 (1)	9 (6)	2 (1)
Bronchite	24 (8)	1 (< 1)	6 (4)	0 (0)
Rhinopharyngite	19 (6)	0 (0)	1 (< 1)	0 (0)
Infection des voies respiratoires	17 (6)	3 (1)	5 (3)	0 (0)
Infection urinaire	14 (5)	2 (1)	8 (5)	3 (2)

**Tableau 3 : Réactions indésirables à POMALYST®+dexaméthasone (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III (suite)**

Classe de système d'organe/ termes préférés <sup>a</sup>	POMALYST®+dex (n = 300)		HD-dex (n = 149)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
Bronchopneumonie	9 (3)	5 (2)	2 (1)	1 (< 1)
Infection des voies respiratoires inférieures	8 (3)	5 (2)	7 (5)	3 (2)
Infection	8 (3)	3 (1)	3 (2)	1 (< 1)
Septicémie	7 (2)	6 (2)	4 (3)	3 (2)
Infection pulmonaire	7 (2)	3 (1)	3 (2)	1 (< 1)
Choc septique	4 (1)	4 (1)	6 (4)	1 (< 1)
Cellulite	4 (1)	3 (1)	2 (1)	1 (< 1)
Septicémie neutropénique	3 (1)	3 (1)	0 (0)	0 (0)
<b>Troubles du métabolisme et de la nutrition<sup>c</sup></b>				
Baisse de l'appétit	30 (10)	2 (1)	11 (7)	2 (1)
Hypokaliémie	20 (7)	9 (3)	10 (7)	4 (3)
Hypercalcémie	19 (6)	11 (4)	16 (11)	8 (5)
Hyperglycémie	15 (5)	9 (3)	12 (8)	10 (7)
Déshydratation	13 (4)	3 (1)	9 (6)	2 (1)
Hyperkaliémie	8 (3)	5 (2)	0 (0)	0 (0)
Hyperuricémie	8 (3)	3 (1)	6 (4)	3 (2)
Hyponatrémie	7 (2)	6 (2)	3 (2)	3 (2)
<b>Troubles musculosquelettiques et des tissus conjonctifs</b>				
Douleur dorsale	44 (15)	11 (4)	20 (13)	5 (3)
Douleurs osseuses	44 (15)	19 (6)	15 (10)	4 (3)
Spasmes musculaires	30 (10)	1 (< 1)	9 (6)	1 (1)
Arthralgie	14 (5)	1 (< 1)	6 (4)	1 (1)
Douleur aux membres	12 (4)	4 (1)	8 (5)	1 (< 1)
Faiblesse musculaire	8 (3)	3 (1)	16 (11)	4 (3)
Douleur thoracique musculosquelettique	9 (3)	3 (1)	2 (1)	1 (< 1)
<b>Troubles du système nerveux</b>				
Neuropathie périphérique <sup>b</sup>	34 (11)	3 (1)	14 (9)	2 (1)
Étourdissements	27 (9)	2 (1)	9 (6)	1 (1)
Céphalées	15 (5)	0	7 (5)	0
Tremblements	15 (5)	2 (1)	2 (1)	0 (0)

**Tableau 3 : Réactions indésirables à POMALYST®+dexaméthasone (population pour évaluation de l'innocuité) signalées lors de l'essai de phase III (suite)**

Classe de système d'organe/ termes préférés <sup>a</sup>	POMALYST®+dex (n = 300)		HD-dex (n = 149)	
	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
Syncope	7 (2)	3 (1)	1 (< 1)	1 (< 1)
Altération du niveau de conscience	4 (1)	3 (1)	0 (0)	0 (0)
<b>Troubles psychiatriques</b>				
Insomnie	24 (8)	1 (< 1)	31 (21)	4 (3)
État confusionnel	11 (4)	7 (2)	8 (5)	2 (1)
<b>Troubles rénaux et urinaires</b>				
Insuffisance rénale	12 (4)	9 (3)	3 (2)	2 (1)
Insuffisance rénale aiguë	11 (4)	9 (3)	7 (5)	4 (3)
<b>Troubles de l'appareil reproducteur et des seins</b>				
Douleur pelvienne	5 (2)	4 (1)	3 (2)	0 (0)
<b>Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux</b>				
Dyspnée	50 (17)	14 (5)	17 (11)	7 (5)
Toux	45 (15)	1 (< 1)	12 (8)	0 (0)
Épistaxis	27 (9)	2 (< 1)	14 (9)	3 (2)
Embolie pulmonaire	3 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)
<b>Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés</b>				
Prurit	21 (7)	0 (0)	4 (3)	0 (0)
Éruptions cutanées	20 (7)	3 (1)	1 (1)	0 (0)

<sup>a</sup> Les classes de systèmes et d'organes et les termes préférés sont encodés selon la version 14.0 du dictionnaire MedDRA. Les classes de systèmes et d'organe sont énumérées par ordre alphabétique de langue anglaise, et les termes préférés sont énumérés en ordre descendant de fréquence pour le groupe sous POMALYST®+dex. Un patient qui présente plusieurs épisodes d'une réaction indésirable n'est comptabilisé qu'une seule fois dans cette catégorie de réaction indésirable. La gravité des toxicités est classée selon la Version 4 des critères communs de toxicité (CTCAE) du National Cancer Institute.

<sup>b</sup> Le terme neuropathie périphérique regroupe : paresthésie, neuropathie périphérique, troubles de la démarche, polyneuropathie, hypoesthésie, dysesthésie, sensation de brûlure, névralgie, neuropathie motrice périphérique et perte sensorielle.

<sup>c</sup> Les anomalies aux analyses de laboratoire des classes de système et d'organe liées aux troubles des systèmes sanguin et lymphatique et aux troubles du métabolisme et de la nutrition sont considérées comme des réactions indésirables seulement si ces anomalies : ont entraîné un abandon de l'étude, ont nécessité un traitement, une modification/interruption de la dose ou toute autre intervention thérapeutique ou ont été jugées significativement importantes au plan clinique.

<sup>d</sup> Tous les termes préférés de la classe Infections et infestations des CSO (y compris les infections bactériennes, virales et fongiques) sauf les infections rares d'intérêt pour la santé publique seront considérés inscrits.

Noter : Les réactions indésirables énumérées au Tableau 3 sont définies comme toute réaction indésirable qui est survenue ou s'est aggravée au moment où le médicament à l'étude a été administré pour la première fois ou après et à l'intérieur des 30 jours suivant la fin de son administration.



## **Réactions indésirables au médicament moins courantes lors des essais cliniques ( $\geq 1\%$ à $< 5\%$ )**

Les réactions indésirables apparues sous traitement signalées chez  $\geq 1\%$  à  $< 5\%$  des patients dans le groupe sous POMALYST<sup>®</sup>, dexaméthasone et bortézomib sont les suivantes :

**Troubles des systèmes sanguin et lymphatique :** lymphadénopathie

**Troubles cardiaques :** palpitations, insuffisance cardiaque, tachycardie, extrasystoles

**Troubles oculaires :** vision trouble, cataracte, conjonctivite

**Troubles gastro-intestinaux :** douleur abdominale, dyspepsie, sécheresse de la bouche, distension abdominale, stomatite, douleur abdominale haute, flatulences, maux de dents

**Troubles généraux et problèmes au point d'administration :** frissons, malaise, douleur thoracique, inflammation muqueuse, douleur thoracique non cardiaque, troubles de la démarche, œdème

**Troubles hépatobiliaires :** hépatotoxicité ( $< 1\%$ ), hyperbilirubinémie ( $< 1\%$ )

**Troubles du système immunitaire :** hypersensibilité au médicament

**Infections et infestations :** sinusite, candidose orale, rhinite, cystite, otite, gastro-entérite, herpès, zona, septicémie neutropénique, herpès buccal, pharyngite

**Analyses de laboratoire :** augmentation de la créatinine sanguine, diminution du poids, augmentation du taux de protéine C réactive, diminution de l'hématocrite, augmentation de l'aspartate aminotransférase, diminution du bicarbonate sanguin, diminution de la numération lymphocytaire, diminution de la numération érythrocytaire, augmentation du poids

**Troubles du métabolisme et de la nutrition :** hypocalcémie, hypoalbuminémie, hyperphosphatémie, hypomagnésémie

**Troubles musculosquelettiques et des tissus conjonctifs :** douleur musculosquelettique, myalgie, douleur à l'aîne, douleur au cou, douleur à la mâchoire, fracture pathologique

**Troubles du système nerveux :** paresthésie, neuropathie périphérique, léthargie, dysgueusie, hypoesthésie, trouble de l'équilibre, polyneuropathie, somnolence

**Troubles psychiatriques :** dépression, agitation, altération de l'humeur, anxiété, troubles du sommeil, désorientation, agitation

**Troubles rénaux et urinaires :** pollakiurie, dysurie, insuffisance rénale, rétention urinaire, hématurie, incontinence urinaire

**Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux :** dyspnée à l'effort, dysphonie, douleur oropharyngée, toux productive, hoquet, épanchement pleural, congestion nasale, embolie pulmonaire, sibilances, pneumonite ( $< 1\%$ )

**Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés :** diaphorèse nocturne, hyperhidrose, érythème, éruption cutanée généralisée, alopecie, ulcère de décubitus, sécheresse de la peau

**Troubles vasculaires :** hypotension, hypertension, hématome, bouffées vasomotrices, thrombose veineuse profonde

## **Résultats anormaux aux analyses hématologiques et biochimiques**

Des anomalies hématologiques surviennent souvent chez les patients qui souffrent de myélome multiple avancé. Lors de l'étude MM-003, des pourcentages substantiellement plus élevés de sujets du groupe sous POMALYST®+dexaméthasone que du groupe sous HD-dex ont présenté des anomalies de grade 3 ou 4 des leucocytes (44,6 % vs 12,4 %) et des neutrophiles (55,1 % vs 16,3 %). La neutropénie est survenue le plus souvent au cours des trois premiers cycles. Les pourcentages de sujets ayant manifesté des anomalies de grade 3 ou 4 liées à l'hémoglobine, aux lymphocytes et aux plaquettes ont été similaires dans les groupes traités par POMALYST®+dexaméthasone et HD-dex. Pour la plupart des paramètres de biochimie clinique, les pourcentages de sujets ayant présenté des anomalies de grade 3 ou 4 ont été relativement faibles et similaires dans les deux groupes traités, sans différences substantielles entre les groupes. Aucune différence substantielle n'a été notée en ce qui a trait aux paramètres des électrolytes sériques.

Le Tableau 4 présente un sommaire de la proportion de patients ayant présenté des changements par rapport à leurs valeurs de départ en cours d'étude pour les paramètres hématologiques et biochimiques, soit une aggravation vers une anomalie de grade 3 ou 4, selon les critères CTCAE.

**Tableau 4 : Détérioration des anomalies, à un grade 3 ou 4, par rapport aux valeurs de départ en cours d'étude selon les critères CTCAE**

Paramètre de laboratoire	POMALYST®+dex	HD-dex
	Grade 3 ou 4 n/N <sup>a</sup> (%)	Grade 3 ou 4 n/N <sup>a</sup> (%)
<b>Anomalie hématologique</b>		
Hémoglobine	67/293 (23 %)*	37/142 (26 %)*
Leucocytes	128/287 (45 %)	17/137 (12 %)
Lymphocytes	150/293 (51 %)	66/140 (47 %)
Neutrophiles	158/287 (55 %)	22/135 (16 %)
Plaquettes	82/290 (28 %)	37/140 (26 %)
<b>Anomalie biochimique clinique</b>		
Alanine aminotransférase	3/258 (1,2 %)*	0
Phosphatase alcaline	3/247 (1,2 %)*	0
Bilirubine	2/259 (0,8 %)*	0
Calcium corrigé	6/258 (2,3 %)	4/120 (3,3 %)
Créatinine	3/259 (1,1 %)	4/120 (3,3 %)
Gamma glutamyl transférase	8/249 (3,2 %)	9/120 (7,5 %)
Glucose	1/233 (0,4 %)	0
Clairance de la créatinine	12/259 (4,6 %)	9/120 (7,5 %)
Phosphate	18/175 (10,3%)*	6/72 (8,3%)*
Potassium	16/259 (6,2 %)	3/119 (2,5 %)*
Albumine	5/258 (1,9 %)*	6/120 (5 %)*
Protéines urinaires	36/268 (13,4 %)*	27/125 (21,6 %)*
Sodium	7/259 (2,7 %)*	7/120 (5,8 %)*
Urate	72/238 (30,2 %)	40/115 (34,8 %)

<sup>a</sup> N = Nombre de sujets pour lesquels on disposait de valeurs au départ et par la suite. Ce chiffre est utilisé comme dénominateur pour le calcul du pourcentage.

n = Nombre de sujets chez qui les valeurs de départ se sont détériorées jusqu'à des anomalies de grade 3 ou 4. Ce chiffre est utilisé comme numérateur pour le calcul du pourcentage.

\*Aucune toxicité de grade 4 n'a été observée.

On applique le pire grade (ou le plus élevé) selon les critères CTCAE si le sujet présente plus d'une valeur de laboratoire détériorée par rapport aux valeurs de départ.

### **Réactions indésirables au médicament déterminées à la suite de la surveillance après commercialisation**

Les réactions indésirables au médicament suivantes ont été recensées à partir de l'expérience mondiale accumulée avec POMALYST® après sa mise en marché et ne sont pas énumérées à la section **Réactions indésirables au médicament lors des essais cliniques**. Comme le signalement de ces réactions se fait sur une base volontaire à partir d'une population d'une taille incertaine, il n'est pas toujours possible d'estimer de façon fiable leur fréquence ou d'établir un lien de cause à effet avec l'exposition au médicament.

**Troubles des systèmes sanguin et lymphatique** : pancytopénie

**Troubles endocriniens** : hypothyroïdie

**Troubles gastro-intestinaux** : hémorragie gastro-intestinale

**Troubles hépatobiliaires** : insuffisance hépatique, hépatite, hépatite cytolytique, lésion hépatique aiguë, stéatose hépatique

**Troubles du système immunitaire** : hypersensibilité, p. ex., œdème angioneurotique, anaphylaxie, urticaire

**Infections et infestations** : réactivation du virus de l'hépatite B

**Analyses de laboratoire** : augmentation des valeurs lors des tests de fonction hépatique, temps de prothrombine (PT) prolongé

**Trouble du métabolisme et de la nutrition** : syndrome de lyse tumorale

**Néoplasies bénignes, malignes et non spécifiées (incluant kystes et polypes)** : carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde

**Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux** : pneumonite, maladie pulmonaire interstitielle, fibrose pulmonaire

**Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés**: Syndrome de Stevens-Johnson, Syndrome de Lyell, syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS)

## **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

### **Aperçu**

La pomalidomide est un substrat de la glycoprotéine P (gp-P) et il est partiellement métabolisé par le CYP1A2 et le CYP3A4. L'utilisation concomitante de POMALYST® avec de puissants inhibiteurs du CYP1A2 est à éviter. Si, pour des raisons médicales, il est impossible d'éviter l'administration concomitante de puissants inhibiteurs du CYP1A2 avec POMALYST® et qu'ils sont coadministrés avec POMALYST®, il faut réduire la dose de POMALYST® de 50 %. On ne dispose pas de données d'innocuité et d'efficacité cliniques sur les patients atteints de myélome multiple à l'appui de l'utilisation concomitante de POMALYST® et de puissants inhibiteurs du

CYP1A2. La coadministration de POMALYST® et d'un puissant inhibiteur du CYP3A4, le kétoconazole, n'a pas exercé d'effet cliniquement pertinent sur l'exposition à POMALYST®. Voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**. Le risque d'événements thromboemboliques peut augmenter lors de l'utilisation concomitante de POMALYST® et d'agents érythropoïétiques, d'hormonothérapie substitutive ou de contraceptifs hormonaux. Le tabagisme peut réduire l'efficacité de POMALYST®. Les interactions avec d'autres médicaments n'ont pas été établies. POMALYST® peut nuire aux facultés mentales et/ou physiques requises pour l'accomplissement de tâches exigeant de la vigilance, comme la conduite automobile ou le maniement d'une machinerie complexe ou dangereuse.

### **Interactions médicament-médicament**

**Tableau 5 : Interactions médicament-médicament avérées ou potentielles**

<b>Nom propre</b>	<b>Réf.</b>	<b>Effet</b>	<b>Commentaire clinique</b>
Inhibiteurs du CYP1A2	EC	La coadministration du puissant inhibiteur du CYP1A2 fluvoxamine avec la pomalidomide en présence de kétoconazole a augmenté de 107 % l'exposition moyenne (ASC-inf) à la pomalidomide, avec un intervalle de confiance à 90 % (91 % à 124 %) comparativement à la pomalidomide plus kétoconazole. Dans une seconde étude visant à évaluer la contribution d'un inhibiteur du CYP1A2 seul aux changements du métabolisme, la coadministration de fluvoxamine seule avec la pomalidomide a fait augmenter l'exposition moyenne (ASC- inf) à la pomalidomide de 125 %, avec un intervalle de confiance à 90 % [98 % à 157 %] comparativement à la pomalidomide seule.	L'utilisation concomitante de POMALYST® avec de puissants inhibiteurs du CYP1A2 est à éviter. Si, pour des raisons médicales, il est impossible d'éviter l'administration concomitante de puissants inhibiteurs du CYP1A2 avec POMALYST® et qu'ils sont coadministrés avec POMALYST®, il faut réduire la dose de POMALYST® de 50 %. Voir <b>POSOLOGIE ET ADMINISTRATION</b> .
Inhibiteurs du CYP3A4	EC	La coadministration de l'inhibiteur du CYP3A4 kétoconazole avec la pomalidomide a fait augmenter l'exposition moyenne (ASC-inf) à la pomalidomide de 19 %, avec un intervalle de confiance à 90 % [10 % à 28 %]	La coadministration de POMALYST® et d'un puissant inhibiteur du CYP3A4, le kétoconazole, n'a pas exercé d'effet cliniquement pertinent sur l'exposition à POMALYST®. Voir <b>PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE, Pharmacologie humaine, Effet d'autres produits médicinaux sur POMALYST®</b> .

EC = essai clinique

Le risque de TVP et d'EP peut potentiellement augmenter avec l'utilisation simultanée d'agents érythropoïétiques ou d'hormonothérapie substitutive durant la ménopause.

Les contraceptifs hormonaux ne sont pas recommandés en raison du risque accru de maladie thromboembolique veineuse.

### **Interactions médicament-aliments**

POMALYST® peut être administré sans égard à la prise d'aliments.

### **Interactions médicament-analyses de laboratoire**

Aucune interaction avec les analyses de laboratoire n'a été établie.

### **Interactions médicament-hygiène de vie**

On a signalé des cas de confusion, de fatigue, d'altération du niveau de conscience et d'étourdissements avec l'utilisation de POMALYST®. Par conséquent, on conseille aux patients d'être prudents s'ils font fonctionner de la machinerie ou s'ils conduisent.

Tabagisme : Chez 14 sujets de sexe masculin en bonne santé ayant fumé 25 cigarettes par jour pendant 10 jours en tout, après une dose orale simple de 4 mg de POMALYST, la C<sub>max</sub> de la pomalidomide a augmenté de 14,4 %, tandis que l'ASC de la pomalidomide a diminué de 32,3 %, comparativement à 13 volontaires de sexe masculin en bonne santé qui étaient non-fumeurs. Il faut informer les patients que le tabagisme pourrait réduire l'efficacité de POMALYST® en raison de l'induction du CYP1A2.

## **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

### **Considérations posologiques**

- Il faut prendre les capsules de POMALYST® (pomalidomide) par voie orale en une seule dose, à peu près à la même heure chaque jour.
- Il ne faut ni ouvrir, ni briser ni mâcher les capsules.
- Il faut avaler les capsules de POMALYST® entières, préférablement avec de l'eau, avec ou sans aliments.
- Il faut informer les patients de ne pas manipuler les capsules plus que nécessaire.
- Il faut conserver les capsules dans leur emballage thermoformé jusqu'au moment de les prendre, à moins que le pharmacien n'indique que cela n'est pas sécuritaire.
- Il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie de POMALYST® en fonction de l'âge.
- Il faut réduire de moitié la dose de départ recommandée de dexaméthasone chez les patients > 75 ans.
- La prise d'antithrombotiques prophylactiques est à recommander.

### **Dose recommandée et ajustements posologiques**

#### **Dose recommandée :**

La dose de départ recommandée de POMALYST® est de 4 mg, par voie orale, une fois par jour. Le schéma posologique de départ de POMALYST® en association avec la dexaméthasone et/ou le bortézomib est résumé dans le Tableau 6.

**Tableau 6 : Schéma posologique pour les patients traités par POMALYST® en raison d'un myélome multiple**

Médicament	Dose	Schéma
------------	------	--------

<b>POMALYST® en association avec le bortézomib et la dexaméthasone</b>		
POMALYST®	4 mg par voie orale une fois par jour (aucun ajustement posologique nécessaire en fonction de l'âge)	Jours 1-14 de chaque cycle de 21 jours jusqu'à la progression de la maladie
dexaméthasone	20 mg par voie orale une fois par jour (chez les patients âgés de > 75 ans, réduire la dose à 10 mg)	Cycles 1-8 : Jours 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 et 12 d'un cycle de 21 jours À partir du cycle 9 : Jours 1, 2, 8 et 9 d'un cycle de 21 jours jusqu'à la progression de la maladie
bortézomib	1,3 mg/m <sup>2</sup> par voie intraveineuse ou sous-cutanée (consulter la monographie de produit du bortézomib avant son utilisation)	Cycles 1-8 : Jours 1, 4, 8 et 11 d'un cycle de 21 jours À partir du cycle 9 : Jours 1 et 8 d'un cycle de 21 jours jusqu'à la progression de la maladie
<b>POMALYST® en association avec la dexaméthasone seule</b>		
POMALYST®	4 mg par voie orale une fois par jour (aucun ajustement posologique nécessaire en fonction de l'âge)	Jours 1-21 de cycles répétés de 28 jours jusqu'à la progression de la maladie
dexaméthasone	40 mg par voie orale une fois par jour (chez les patients âgés de > 75 ans, réduire la dose à 20 mg)	Jour 1, 8, 15 et 22 de cycles répétés de 28 jours jusqu'à la progression de la maladie

L'utilisation de POMALYST® n'est pas indiquée chez les jeunes patients. L'innocuité et l'efficacité de POMALYST® n'ont pas été établies (voir **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations et maladies particulières**).

#### **Ajustements posologiques recommandés :**

##### Ajustement de la dose de départ recommandée de POMALYST® en raison d'interactions médicamenteuses

L'utilisation concomitante de POMALYST® avec de puissants inhibiteurs du CYP1A2 est à éviter. Si, pour des raisons médicales, il est impossible d'éviter l'administration concomitante de puissants inhibiteurs du CYP1A2 (p. ex., fluvoxamine, ciprofloxacine) avec POMALYST® et qu'ils sont coadministrés avec POMALYST®, il faut réduire la dose de POMALYST® de 50 % et exercer une surveillance étroite sur le plan des effets secondaires. Voir **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**.

##### Ajustement de la dose de départ recommandée de POMALYST® en cas d'insuffisance rénale :

Pour les patients qui ont une insuffisance rénale grave (ClCr < 30 mL/min) nécessitant une dialyse, la dose de départ recommandée de POMALYST® est de 3 mg par jour (réduction de dose de 25 %). Les jours d'hémodialyse, les patients doivent prendre POMALYST® après la

dialyse. Voir **MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, populations particulières, SURDOSAGE** et **ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, populations et maladies particulières**.

Ajustement de la dose de départ recommandée de POMALYST® en cas d'insuffisance hépatique :

Pour les patients qui ont une insuffisance hépatique légère ou modérée (classes A ou B de Child-Pugh), la dose de départ recommandée de POMALYST® est de 3 mg par jour (réduction de dose de 25 %). Pour les patients qui ont une insuffisance hépatique grave (classe C de Child-Pugh), la dose recommandée de POMALYST® est de 2 mg (réduction de dose de 50 %) (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, populations particulières** et **ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, populations et maladies particulières**).

Avant de commencer un traitement par POMALYST®, la numération des neutrophiles doit être  $\geq 1\ 000/\mu\text{L}$  et la numération plaquettaire  $\geq 50\ 000/\mu\text{L}$ .

La posologie est maintenue ou modifiée en fonction des résultats des épreuves cliniques et des analyses de laboratoire.

Modification ou interruption de dose :

Les instructions pour les interruptions ou réductions de dose de POMALYST® en lien avec des réactions indésirables hématologiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 7 : Instructions pour la modification des doses en cas de toxicité hématologique**

<b>Toxicité</b>	<b>Modification de dose</b>
<p><b><u>Neutropénie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NAN* &lt; 500/μL ou neutropénie fébrile (fièvre ≥ 38,5 °C et NAN &lt; 1 000/μL)</li> </ul>	<p>Suspendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup>, vérifier la FSC** toutes les semaines. Envisager un traitement par G-CSF*** selon l'indication clinique.</p> <p>Lorsque la NAN revient à ≥ 1 000/μL, reprendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup> à 3 mg par jour.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour chaque baisse subséquente &lt; 500/μL</li> </ul>	<p>Suspendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup>.</p> <p>Lorsque la NAN revient à ≥ 1 000/μL, reprendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup> à 1 mg de moins que la dose précédente.</p>
<p><b><u>Thrombocytopénie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Numération plaquettaire &lt; 25 000/μL</li> </ul>	<p>Suspendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup>, vérifier la FSC** toutes les semaines.</p> <p>Lorsque la numération plaquettaire revient à ≥ 50 000/μL, reprendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup> à raison de 3 mg par jour.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour chaque baisse subséquente &lt; 25 000/μL</li> </ul>	<p>Suspendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup>.</p> <p>Lorsque la numération plaquettaire revient à ≥ 50 000/μL, reprendre le traitement par POMALYST<sup>®</sup> à 1 mg de moins que la dose précédente.</p>

\*NAN – numération absolue des neutrophiles; \*\*FSC – formule sanguine complète; \*\*\*G-CSF – facteur stimulant les colonies de granulocytes

Pour amorcer un nouveau cycle de POMALYST<sup>®</sup>, la numération des neutrophiles doit être ≥ 1 000/μL et la numération plaquettaire ≥ 50 000/μL.

Pour les autres réactions indésirables de grade 3 ou 4 jugées en lien avec POMALYST<sup>®</sup>, suspendre le traitement. Le traitement peut être repris à 1 mg de moins que la dose précédente lorsque ces réactions indésirables ont été ramenées à un grade ≤ 2, à la discrétion du médecin. Si des réactions indésirables de grade 3 ou 4 surviennent après les réductions de dose jusqu'à 1 mg, il faut cesser le médicament.

La suspension ou l'arrêt de la pomalidomide est à envisager en présence d'un érythème cutané de grade 2-3; le traitement ne doit être repris que si les bienfaits escomptés ne l'emportent sur les risques potentiels. La pomalidomide doit être cessée définitivement en présence d'œdème angioneurotique, d'anaphylaxie et d'érythème cutané de grade 4. Si l'érythème cutané prend une forme exfoliative, purpurique ou bulleuse ou si on soupçonne un syndrome de Stevens-Johnson, un syndrome de Lyell ou un syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, il faut cesser définitivement POMALYST<sup>®</sup> (voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système immunitaire**).



Il faut interrompre l'administration de POMALYST® pendant la vérification des signes et symptômes de MPI. L'administration de POMALYST® ne doit être reprise qu'après une évaluation approfondie des bienfaits et des risques. Voir **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Maladie pulmonaire interstitielle**.

Pour les modifications posologiques en raison d'une toxicité observée avec le bortézomib, consulter la monographie de produit du bortézomib.

### **Dose omise**

Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis la dose omise, le patient peut prendre la dose. Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis la dose omise à l'heure prévue, le patient ne doit pas prendre la dose, mais plutôt prendre la dose suivante à l'heure normale, le lendemain. Les patients ne doivent pas prendre deux doses à la fois.

### **SURDOSAGE**

Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région.
---

On dispose de peu de renseignements sur le surdosage de POMALYST® (pomalidomide). Aucun cas de surdosage n'a été signalé lors des études cliniques. Des doses de POMALYST® allant jusqu'à 50 mg en prises simples chez des volontaires en bonne santé et 10 mg en prises multiples unquotidiennes chez des patients atteints de myélome multiple ont fait l'objet d'études sans que l'on signale d'événements indésirables graves en lien avec un surdosage. Il n'existe aucun renseignement propre au traitement du surdosage de POMALYST®. La pomalidomide a été éliminée par l'hémodialyse.

### **MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE**

#### **Mode d'action**

La pomalidomide, un analogue de la thalidomide, est un agent immunomodulateur doté de propriétés antinéoplasiques. Lors de tests cellulaires *in vitro*, la pomalidomide a inhibé la prolifération et induit l'apoptose des cellules tumorales hématopoïétiques. De plus, la pomalidomide a inhibé la prolifération de lignées cellulaires myélomateuses résistantes à la lénalidomide et a agi en synergie avec la dexaméthasone dans des lignées cellulaires sensibles et résistantes à la lénalidomide, de manière à induire l'apoptose des cellules tumorales. La pomalidomide a rehaussé l'immunité médiée par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles (NK) et inhibé la production de cytokines pro-inflammatoires (p. ex., facteur de nécrose tumorale alpha [TNF- $\alpha$ ] et interleukine-6 [IL-6]) par les monocytes. La pomalidomide a exercé une activité antiangiogénique dans un modèle tumoral murin et dans un modèle de cordon ombilical *in vitro*.

La pomalidomide se lie directement à la protéine céréblon (CRBN), une composante d'un complexe ligase E3 comprenant les protéines DDB1 (DNA [deoxyribonucleic acid] damage-binding protein 1), CUL4 (cullin 4) et Roc1, et peut inhiber l'auto-ubiquitylation de la protéine CRBN à l'intérieur du complexe. Les ubiquitines ligases E3 sont à l'origine de la poly-

ubiquitinylation d'une variété de protéines substrats, et peuvent partiellement expliquer les effets cellulaires pléiotropiques observés avec le traitement par pomalidomide.

En présence de pomalidomide *in vitro*, les protéines substrats Aiolos et Ikaros sont la cible d'une ubiquitinylation et d'une dégradation subséquente entraînant des effets cytotoxiques et immunomodulateurs directs. *In vivo*, le traitement par pomalidomide a entraîné une réduction du taux de protéine Ikaros chez les patients atteints de myélome multiple récidivant réfractaire à la lénalidomide.

### Électrophysiologie cardiaque

Une étude approfondie de l'intervalle QT/QTc a été menée pour évaluer les effets de la pomalidomide sur l'intervalle QT à des doses uniques de 4 mg et de 20 mg. Une dose unique de pomalidomide allant jusqu'à 20 mg n'a pas été associée à une prolongation de l'intervalle QT chez des sujets masculins en santé. On ne s'attend pas à ce que la pomalidomide entraîne chez les patients une prolongation de l'intervalle QT significative sur le plan clinique aux doses thérapeutiques approuvées.

### Pharmacocinétique

**Tableau 8 : Sommaire des paramètres pharmacocinétiques moyens d'une dose simple de pomalidomide chez des patients atteints de myélome multiple**

	<b>C<sub>max</sub></b> <b>(ng/mL)</b>	<b>t<sub>1/2</sub> (h)</b>	<b>ASC<sub>0-8</sub></b> <b>(ng·h/mL)</b>	<b>Clairance</b> <b>(L/h)</b>	<b>Volume de</b> <b>distribution</b> <b>(L)</b>
<b>4 mg</b>	78,8	7,5 <sup>†</sup>	411	8,31*	73,78*

<sup>†</sup> La demi-vie d'élimination terminale apparente moyenne chez les patients atteints de MM a été similaire avec tous les niveaux de dose et pour chaque journée d'administration, 1 mg die, 2 mg die, 10 mg die et 5 mg q2j

\*Chez des sujets de sexe masculin en bonne santé

ASC<sub>0-8</sub> = aire sous la courbe concentration plasmatique-temps à partir du temps zéro jusqu'à la dernière concentration quantifiable, soit huit heures post-dose

**Absorption :** La pomalidomide est absorbé avec une C<sub>max</sub> d'au moins 73 %, qui s'obtient deux à trois heures après l'administration orale d'une dose simple. L'exposition systémique (ASC) à la pomalidomide augmente de façon linéaire et à peu près proportionnelle à la dose.

L'accumulation est minime, voire imperceptible. Ces données se fondent sur les résultats observés chez des sujets en bonne santé. L'exposition chez des patients atteints de myélome multiple est similaire à ce qui s'observe chez des sujets de sexe masculin en bonne santé. On observe une accumulation minimale après de multiples doses chez des patients atteints de MM (27-33 %). On note une variabilité modérée (% du CV) allant de 11 % à 55 % entre les sujets pour l'ASC et la C<sub>max</sub> chez les patients atteints de MM.

La pomalidomide est un substrat de la glycoprotéine P *in vitro*, mais cela n'a pas semblé limiter son absorption chez l'humain, où au moins 73 % du médicament ont été absorbés. La coadministration de la pomalidomide avec l'inhibiteur de la glycoprotéine P kétoconazole n'a exercé aucun effet cliniquement pertinent sur l'exposition à la pomalidomide. Par conséquent, on ne prévoit aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative lorsque la pomalidomide est coadministrée avec des inhibiteurs de la glycoprotéine P.

Sa coadministration avec des repas hypercaloriques et à forte teneur en lipides ralentit son taux d'absorption et réduit la  $C_{\max}$  plasmatique d'environ 25 %, mais exerce un effet minime sur l'absorption globale, avec une baisse de 8 % de l'ASC. Par conséquent, la pomalidomide peut être administrée sans égard à la prise d'aliments.

**Distribution :** La pomalidomide a un volume de distribution (Vd) apparent moyen qui se situe entre 62 et 138 L à l'état d'équilibre. La pomalidomide est présente dans le sperme des sujets en bonne santé à une concentration d'environ 67 % de la concentration plasmatique quatre heures après la dose ( $\sim T_{\max}$ ) après quatre jours d'administration quotidienne à raison de 4 mg. *In vitro*, la fixation des énantiomères de la pomalidomide aux protéines du plasma humain varie de 12 % à 44 % et ne dépend pas de la concentration. On ignore si la pomalidomide ou ses métabolites sont présents dans le lait maternel. La pomalidomide a été décelée dans le lait de rates allaitantes après son administration aux mères. En raison du risque potentiel de réactions indésirables à la pomalidomide chez les nourrissons, il faut décider soit de cesser l'allaitement, soit de cesser le médicament en tenant compte de l'importance du médicament pour la mère.

**Métabolisme :** La pomalidomide est le principal élément circulant (environ 70 % de la radioactivité plasmatique) *in vivo* chez des sujets en bonne santé qui ont reçu une dose orale simple de pomalidomide marquée au  $^{14}\text{C}$  (2 mg). Aucun métabolite n'était présent à une concentration > 10 % par rapport à la molécule mère ou à la radioactivité totale dans le plasma.

La pomalidomide est fortement métabolisée avant son excrétion chez l'être humain par de multiples voies, y compris le métabolisme médié par le CYP et l'hydrolyse non dépendante du CYP. Les voies métaboliques principales de la radioactivité excrétée sont l'hydroxylation, avec la glucuronidation ou l'hydrolyse qui s'ensuivent. *In vitro*, on a reconnu le CYP1A2 et le CYP3A4 comme les principales enzymes en jeu dans l'hydroxylation de la pomalidomide médiée par le CYP, avec une contribution additionnelle mineure de la part du CYP2C19 et du CYP2D6.

L'administration de pomalidomide à des fumeurs, le tabagisme étant connu pour induire l'isoforme CYP1A2, a augmenté l'exposition à la pomalidomide comparativement à l'exposition à la pomalidomide observée chez les non-fumeurs. Chez 14 sujets de sexe masculin en bonne santé ayant fumé 25 cigarettes par jour pendant 10 jours en tout, après une dose orale simple de 4 mg de POMALYST, la  $C_{\max}$  de la pomalidomide a augmenté de 14,4 %, tandis que l'ASC de la pomalidomide a diminué de 32,3 %, comparativement à 13 volontaires de sexe masculin en bonne santé qui étaient non-fumeurs.

La coadministration de la pomalidomide avec le puissant inhibiteur du CYP3A4/5 kétoconazole ou le puissant inducteur du CYP3A4/5 carbamazépine n'a exercé aucun effet cliniquement pertinent sur l'exposition à la pomalidomide. La coadministration du puissant inhibiteur du CYP1A2 fluvoxamine avec la pomalidomide en présence de kétoconazole a fait augmenter de 107 % l'exposition moyenne (ASC-inf) à la pomalidomide, avec un intervalle de confiance de 90 % (91% - 124 %), comparativement à la pomalidomide plus kétoconazole. Dans une seconde étude visant à évaluer la contribution d'un inhibiteur du CYP1A2 seul aux changements du métabolisme de la pomalidomide, une dose simple de pomalidomide a été administrée au Jour 5 de l'administration de fluvoxamine (état d'équilibre). La coadministration de fluvoxamine seule avec la pomalidomide a fait augmenter l'exposition moyenne (ASC- inf) à la pomalidomide de 125 %, avec un intervalle de confiance à 90 % [98 % à 157 %] comparativement à la

pomalidomide seule et a fait augmenter la demi-vie de la pomalidomide de 5,97 heures (pomalidomide seule) à 13,09 heures (pomalidomide plus fluvoxamine). L'utilisation concomitante de POMALYST® avec de puissants inhibiteurs du CYP1A2 est à éviter. Si, pour des raisons médicales, il est impossible d'éviter l'administration concomitante de puissants inhibiteurs du CYP1A2 (p. ex., fluvoxamine, ciprofloxacine) avec POMALYST® et qu'ils sont coadministrés avec POMALYST®, il faut réduire la dose de POMALYST® de 50 %. Voir **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES** et **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**.

**Excrétion :** La pomalidomide est éliminée à raison d'une demi-vie plasmatique médiane d'environ 9,5 heures chez des sujets en bonne santé et d'environ 7,5 heures chez des sujets atteints de myélome multiple. La pomalidomide a une clairance corporelle totale moyenne de 7-10 L/h.

Après l'administration d'une dose simple de pomalidomide marquée au <sup>14</sup>C (2 mg) à des sujets en bonne santé, environ 73 % et 15 % de la dose radioactive ont été éliminés dans l'urine et les selles, respectivement, avec environ 2 % et 8 % de la dose de carbone radiomarqué étant éliminée sous forme de pomalidomide dans l'urine et les selles. Les trois principaux métabolites dans l'urine (formés par hydrolyse ou hydroxylation avec glucuronidation subséquente) ont représenté environ 23 %, 17 % et 12 %, respectivement de la dose dans l'urine.

Les métabolites dépendants du CYP ont représenté environ 43 % de la radioactivité totale excrétée, tandis que les métabolites hydrolytiques non dépendants du CYP ont représenté 25 % et que l'excrétion de la pomalidomide inchangée a représenté 10 %.

### **Populations et maladies particulières**

**Pédiatrie :** On ne dispose d'aucune donnée pharmacocinétique sur les patients de moins de 18 ans. POMALYST® a été évalué lors d'une étude ouverte de détermination de la posologie de phase 1 menée auprès de 26 jeunes patients (intervalle : de 5 à 17 ans) atteints de tumeurs récurrentes, progressives ou réfractaires du système nerveux central (SNC). La majorité des patients ont présenté une progression de la maladie au cours des deux mois suivant la prise de la première dose. L'innocuité et l'efficacité de POMALYST® n'ont pas été établies chez ces jeunes patients.

**Gériatrie :** Aucune étude pharmacocinétique n'a porté sur la population gériatrique.

**Sexe :** Les effets du sexe sur la pharmacocinétique de la pomalidomide n'ont fait l'objet d'aucune étude.

**Race :** Les différences pharmacocinétiques associées à la race n'ont fait l'objet d'aucune étude.

**Insuffisance hépatique :** Les patients qui ont une bilirubine totale sérique > 2,0 mg/dL ont été exclus des études cliniques. Il faut éviter d'administrer POMALYST® aux patients qui présentent une bilirubine sérique supérieure à 1,5 fois la LSN et une AST/ALT supérieure à 3 fois la LSN. Dans une étude à ce sujet, les paramètres pharmacocinétiques ont été modifiés chez les patients atteints d'insuffisance hépatique (définie selon les critères de Child-Pugh, n = 8 par groupe), comparativement aux sujets sains. L'exposition moyenne à la pomalidomide a augmenté de 51 % (IC à 90 %, 9 % - 110 %), en présence de légère insuffisance hépatique (Child-Pugh A), comparativement aux sujets sains. L'exposition moyenne à la pomalidomide a augmenté de 58 % (IC à 90 %, 13 % - 119 %), en présence d'insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B),

comparativement aux sujets sains. L'exposition moyenne à la pomalidomide a augmenté de 72 % (IC à 90 %, 24 % - 138 %) chez les grands insuffisants hépatiques (Child-Pugh C), comparativement aux sujets sains. Un ajustement de la dose est recommandé chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).

**Insuffisance rénale :** Les analyses pharmacocinétiques dans la population ont montré que les paramètres pharmacocinétiques de la pomalidomide n'étaient pas significativement affectés chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée ou grave (définie par la clairance de la créatinine ou le taux de filtration glomérulaire estimé [TFGe]) comparativement aux patients dont la fonction rénale était normale (ClCr  $\geq$  60 mL/minute). L'exposition à la pomalidomide selon la moyenne normalisée de l'ASC a été de 98,2 % (IC à 90 %, 77,4 % - 120,6 %) chez les patients qui avaient une insuffisance rénale modérée (TFGe  $\geq$  30 à  $\leq$  45 mL/minute/1,73 m<sup>2</sup>) comparativement aux patients dont la fonction rénale était normale. L'exposition à la pomalidomide selon la moyenne normalisée de l'ASC a été de 100,2% (IC à 90 %, 79,7 % - 127,0 %) chez les patients atteints d'insuffisance rénale grave ne nécessitant pas de dialyse (ClCr < 30 ou TFGe < 30 mL/minute/1,73 m<sup>2</sup>) comparativement aux patients dont la fonction rénale était normale.

L'exposition à la pomalidomide selon la moyenne normalisée de l'ASC a augmenté de 35,8 % (IC à 90 %, 7,5 % - 70,0 %) chez les patients qui avaient une insuffisance rénale grave nécessitant une dialyse (ClCr < 30 mL/minute nécessitant une dialyse) comparativement aux patients dont la fonction rénale était normale. Chez les patients ayant une insuffisance rénale grave nécessitant une dialyse, la clairance estimée imputable à la dialyse est d'environ 12 L/h, ce qui est plus élevé que la clairance totale de la pomalidomide, indiquant que l'hémodialyse éliminera la pomalidomide de la circulation sanguine.

Un ajustement de la posologie est recommandé chez les patients qui ont une insuffisance rénale grave nécessitant une dialyse (voir **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**).

## **CONSERVATION ET STABILITÉ**

Conserver entre 15 °C et 30 °C. Garder hors de la portée des enfants.

## **INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION**

À l'heure actuelle, on ne dispose d'aucune donnée publiée sur l'absorption cutanée de la pomalidomide. La plupart des établissements de santé recommandent le port de gants de latex pendant la manipulation des agents de chimiothérapie. Les professionnels de la santé peuvent envisager le port de gants lorsqu'ils manipulent directement les capsules de POMALYST<sup>®</sup> (pomalidomide), avec le lavage standard des mains. Les femmes fertiles ou qui prévoient devenir enceintes peuvent manipuler les capsules de POMALYST<sup>®</sup> à la condition de porter des gants de latex.

Il faut informer les patients de ne pas manipuler les capsules plus que nécessaire, de ne pas les ouvrir et de conserver les capsules dans leur emballage thermoformé autant que possible jusqu'au moment de les prendre. En cas de contact avec des capsules de POMALYST<sup>®</sup> non intactes ou la poudre qu'elles contiennent, la zone exposée doit être lavée à l'eau et au savon.

Le remballage de POMALYST<sup>®</sup> ne doit se faire que dans des circonstances exceptionnelles et cette tâche revient exclusivement aux pharmaciens.

## FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Les capsules de POMALYST® (pomalidomide) sont présentées dans des emballages thermoformés à pellicule d'aluminium enfonçable.

Chaque capsule renferme de la pomalidomide, du mannitol, de l'amidon pré-gélatinisé et du stéaryl fumarate de sodium.

La composition additionnelle des enveloppes des capsules est fournie dans le tableau ci-dessous.

**Tableau 9 : Teneurs et description des capsules de POMALYST®**

<b>Teneur</b>	<b>Inscription</b>	<b>Composition – Ingrédients non médicinaux</b>	<b>Couleur</b>	<b>Taille de l'emballage</b>
1 mg	POML <sup>†</sup> 1 mg*	Gélatine, dioxyde de titane, carmin d'indigo, oxyde de fer jaune	Bleu foncé opaque et jaune opaque	Emballages thermoformés de 21 capsules
2 mg	POML 2 mg <sup>†</sup>	Gélatine, dioxyde de titane, carmin d'indigo, oxyde de fer jaune, rouge n° 3 (FD&C)	Bleu foncé opaque et orange opaque	Emballages thermoformés de 21 capsules
3 mg	POML 3 mg <sup>†</sup>	Gélatine, dioxyde de titane, carmin d'indigo, oxyde de fer jaune	Bleu foncé opaque et vert opaque	Emballages thermoformés de 21 capsules
4 mg	POML 4 mg <sup>†</sup>	Gélatine, dioxyde de titane, bleu brillant FCF, carmin d'indigo	Bleu foncé opaque et bleu opaque	Emballages thermoformés de 21 capsules

\*L'inscription est à l'encre blanche et noire. <sup>†</sup>L'inscription est à l'encre blanche.


## PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

### RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

#### Substance pharmaceutique

Nom propre :	Pomalidomide
Nom chimique :	(RS)-4-amino-2-(2,6-dioxo-pipridine-3-yl)-iso-indoline-1,3-dione
	CAS : 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-pipridinyl)-1H-iso-indole-1,3(2H)-dione
Formule moléculaire et masse moléculaire :	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> 273,24 g/mol

Formule développée :



Propriétés physicochimiques : La pomalidomide est une poudre jaune. Elle est légèrement soluble dans les solvants organiques et pour ainsi dire insoluble dans l'eau. La pomalidomide est non hygroscopique et présente un point de fusion d'environ 319 °C. Le pH de la pomalidomide en solution aqueuse est de 6,1. Elle présente un atome de carbone asymétrique et est fabriquée sous forme de mélange racémique.

#### ESSAIS CLINIQUES

L'efficacité et l'innocuité de POMALYST® pour le traitement des patients atteints de myélome multiple ont été évaluées dans le cadre d'études de phase 3 ouvertes et contrôlées contre traitement actif, décrites dans le Tableau 10.

**Tableau 10 : Résumé des essais cliniques pivots chez les patients atteints de myélome multiple**

Étude et plan de l'essai	Posologie, voie d'administration et durée	Patients de l'étude
<p>CC-4047-MM-007 (OPTIMISMM)</p> <p>Étude de phase III multicentrique, randomisée et ouverte comparant le traitement par POMALYST® en association avec la dexaméthasone et le bortézomib au traitement par dexaméthasone et bortézomib chez des patients adultes précédemment traités atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, qui avaient reçu au moins un traitement antérieur, y compris la lénalidomide.</p>	<p>Les patients ont été randomisés dans un rapport de 1:1 dans l'un des 2 groupes de traitement et traités jusqu'à la progression ou l'apparition de réactions indésirables intolérables.</p> <p>POMALYST® à 4 mg les jours 1 à 14 de chaque cycle de 21 jours.</p> <p>Bortézomib à 1,3 mg/m<sup>2</sup> dans les deux groupes de l'étude les jours 1, 4, 8 et 11 d'un cycle de 21 jours pour les cycles 1 à 8; et les jours 1 et 8 d'un cycle de 21 jours à partir du cycle 9 inclusivement.</p> <p>Dexaméthasone à 20 mg/jour (âge ≤ 75 ans) ou à 10 mg/jour (âge &gt; 75 ans) dans les deux groupes de l'étude les jours 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 et 12 d'un cycle de 14 jours pour les cycles 1 à 8; et les jours 1, 2, 8 et 9 de chaque cycle de 21 jours subséquent à partir du cycle 9 inclusivement.</p>	<p>n = 559</p> <p>POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib = 281</p> <p>POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib = 278</p>
<p>CC-4047-MM-003</p> <p>Étude de phase III multicentrique, randomisée et ouverte comparant POMALYST® en association avec la dexaméthasone à l'HD-dex chez des patients adultes précédemment traités atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire, qui avaient déjà reçu au moins deux formes de traitement, qui avaient connu un échec avec la lénalidomide et le bortézomib et dont la maladie avait progressé au cours du plus récent traitement.</p>	<p>Les patients ont été répartis aléatoirement selon un rapport 2:1 dans l'un des deux groupes de traitement suivants :</p> <p>POMALYST®+dexaméthasone (POMALYST® 4 mg/jour aux jours 1-21 et dexaméthasone 40 mg aux jours 1, 8, 15 et 22 d'un cycle de 28 jours) (les patients &gt; 75 ans recevaient 20 mg de dexaméthasone); ou</p> <p>HD-dex (40 mg aux jours 1 à 4, 9 à 12 et 17 à 20 d'un cycle de 28 jours). (Les patients &gt; 75 ans recevaient 20 mg de dexaméthasone.)</p>	<p>n = 455</p> <p>POMALYST®, dexaméthasone = 302</p> <p>HD-dex = 155</p>



## **POMALYST® en association avec la dexaméthasone et le bortézomib chez les patients atteints de myélome multiple ayant déjà été traités**

### **Caractéristiques démographiques et plan de l'étude**

L'efficacité et l'innocuité de POMALYST® en association avec le bortézomib et la dexaméthasone ont été comparées à celles du bortézomib et de la dexaméthasone dans l'étude CC-4047-MM-007. Les critères d'admissibilité clés comprenaient : patients atteints de myélome multiple ayant déjà reçu de 1 à 3 traitements antimyélomateux et dont la maladie avait progressé lors du traitement le plus récent ou après celui-ci. Les patients devaient aussi avoir déjà été traités à l'aide d'un schéma thérapeutique incluant la lénalidomide. Les patients qui avaient reçu un précédent traitement antimyélome contenant du bortézomib étaient admissibles, pourvu qu'ils n'aient pas présenté une progression pendant le traitement ou dans les 60 jours suivant la dernière dose du traitement contenant du bortézomib selon le schéma posologique à raison d'une dose de 1,3 mg/m<sup>2</sup> deux fois par semaine. Environ 70 % des patients étaient réfractaires à la lénalidomide (71,2 % dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib, et 68,7 % dans le groupe sous dexaméthasone et bortézomib). Le caractère réfractaire est défini par la non-réponse (au minimum, réponse minimale non atteinte ou progression dans les 60 jours suivant la dernière dose) aux médicaments la dernière fois qu'ils ont été administrés au patient. Environ 40 % des patients étaient dans leur 1<sup>re</sup> récurrence, et environ 73 % des patients avaient reçu du bortézomib comme traitement précédent. À la randomisation, les patients ont été stratifiés en fonction de l'âge ( $\leq 75$  ans comparativement à  $> 75$  ans), du nombre de traitements antimyélome précédents (1 comparativement à  $> 1$ ), et du taux de  $\beta_2m$  à la sélection ( $< 3,5$  mg/L comparativement à  $\geq 3,5$  mg/L -  $\leq 5,5$  mg/L comparativement à  $> 5,5$  mg/L).

Parmi les patients, les caractéristiques initiales liées au patient et à la maladie étaient généralement comparables entre les 2 groupes (voir le Tableau 11).

Le critère d'efficacité principal était la survie sans progression (SSP), définie comme le temps écoulé entre la randomisation et la progression de la maladie ou la mort, selon la première éventualité. La réponse était évaluée par un comité d'adjudication indépendant chargé d'évaluer la réponse selon les critères de l'IMWG en utilisant la population en intention de traiter (IdT) pour l'analyse principale. Les autres critères d'efficacité importants étaient le taux de réponse objective (TRO), la durée de la réponse (DR) et la survie globale (SG).

**Tableau 11 : Sommaire des caractéristiques démographiques des patients et des caractéristiques de la maladie au départ**

	<b>POMALYST®+ dex + bortézomib (N = 281)</b>	<b>dex + bortézomib (n = 278)</b>
<b>Âge (ans)</b>		
Médian (min, max)	67 (29, 87)	68 (27, 89)
<b>Distribution selon l'âge, n (%)</b>		
$\leq 65$ ans	123 (43,8)	120 (43,2)
$> 65$ ans	158 (56,2)	158 (56,8)

**Tableau 11 : Sommaire des caractéristiques démographiques des patients et des caractéristiques de la maladie au départ (suite)**

	<b>POMALYST®+ dex + bortézomib (N = 281)</b>	<b>dex + bortézomib (n = 278)</b>
> 75 ans	46 (16,4)	47 (16,9)
<b>Sexe, n (%)</b>		
Hommes	155 (55,2)	147 (52,9)
Femmes	126 (44,8)	131 (47,1)
<b>Stade de l'ISS à l'admission à l'étude, n (%)<sup>a</sup></b>		
I	149 (53,0)	138 (49,6)
II	85 (30,2)	90 (32,4)
III	47 (16,7)	50 (18)
<b>Anomalie cytogénétique, n (%)</b>		
À risque élevé <sup>b</sup>	61 (21,7)	49 (17,6)
Non à risque élevé	137 (48,8)	132 (47,5)
<b>Distribution des précédentes lignes de traitement antimyélome<sup>c</sup>, n (%)</b>		
1	111 (39,5)	117 (41,4)
≥ 2	170 (60,5)	163 (58,6)
<b>Exposition à des traitements antérieurs contre le myélome, n (%)</b>		
<b>Agents immunomodulateurs</b>	<b>281 (100)</b>	<b>278 (100)</b>
Lénalidomide	281 (100)	278 (100)
<b>Inhibiteurs du protéasome</b>	<b>212 (75,4)</b>	<b>213 (76,6)</b>
Bortézomib	201 (71,5)	203 (73)
<b>Réfractaire à de précédents traitements antimyélome courants, n (%)</b>		
<b>Agents immunomodulateurs</b>	<b>202 (71,9)</b>	<b>193 (69,4)</b>
Lénalidomide	200 (71,2)	191 (68,7)
<b>Inhibiteurs du protéasome</b>	<b>37 (13,2)</b>	<b>37 (13,3)</b>
Bortézomib <sup>d</sup>	24 (8,5)	32 (11,5)
<b>Réfractaire au dernier traitement contre le myélome, n (%)</b>	<b>196 (69,8)</b>	<b>184 (66,2)</b>
<b>Score fonctionnel ECOG, n (%)</b>		
0	149 (53,0)	137 (49,3)
1	121 (43,1)	119 (42,8)

**Tableau 11 : Sommaire des caractéristiques démographiques des patients et des caractéristiques de la maladie au départ (suite)**

	<b>POMALYST® + dex + bortézomib (N = 281)</b>	<b>dex + bortézomib (n = 278)</b>
2	11 (3,9)	22 (7,9)
<b>CICr au diagnostic, n (%)</b>		
< 30 mL/min	11 (3,9)	10 (3,6)
30 - < 45 mL/min	26 (9,3)	28 (10,1)
45 - < 60 mL/min	54 (19,2)	38 (13,7)
60 - < 80 mL/min	71 (25,3)	80 (28,8)
≥ 80 mL/min	119 (42,3)	122 (43,9)

<sup>a</sup> Le stade selon le système de stadification international ISS (International Staging System) est calculé en utilisant les valeurs initiales de l'albumine et de la bêta-2-microglobuline.

<sup>b</sup> Le statut à risque élevé est défini par la présence d'au moins une anomalie cytogénétique parmi les suivantes : Del(17p), t(4;14), t(14;16).

<sup>c</sup> Une ligne thérapeutique est définie par le statut de progression du sujet. Seul un traitement administré après une progression de la maladie est compté comme une nouvelle ligne.

<sup>d</sup> Les sujets réfractaires au bortézomib étaient admissibles pourvu qu'ils n'aient pas eu une MP pendant le traitement ou dans les 60 jours suivant la dernière dose du traitement contenant du bortézomib selon le schéma posologique à raison d'une dose de 1,3 mg/m<sup>2</sup> deux fois par semaine.

Date limite de la collecte des données : 26 octobre 2017

## Résultats de l'étude

La durée médiane du traitement était de 8,8 mois (12 cycles de traitement) dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib et de 4,9 mois (7 cycles de traitement) dans le groupe sous dexaméthasone et bortézomib.

Les résultats sur l'efficacité sont résumés dans le

Tableau 12 ci-dessous. L'analyse finale de la SSP, le critère d'évaluation principal avec une date limite de la collecte des données le 26 octobre 2017, a été menée sur 316 événements (57 % de la population en IdT). La SSP a été significativement plus longue dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib que dans le groupe sous dexaméthasone et bortézomib : risque relatif (RR) de 0,61 (IC à 95 % : 0,49, 0,77), valeur p < 0,0001. La courbe de Kaplan-Meier pour la SSP dans la population en IdT est illustrée à la Figure 1.

Selon l'analyse intermédiaire prédéfinie pour la SG (date limite de la collecte des données le 26 octobre 2017), après une période de suivi médiane de 15,9 mois, la différence de SG entre les groupes de traitement (RR = 0,98, IC à 95 % : 0,73, 1,32; p = 0,894) n'a pas dépassé le seuil de supériorité préspecifié. Le taux d'événements global étant de 31,5 %, les données sur la SG ne sont pas considérées comme matures.

**Tableau 12 : Résumé des données sur l'efficacité globale (population en IdT)**

	<b>POMALYST®+ dex + bortézomib (n = 281)</b>	<b>dex + bortézomib (n = 278)</b>
<b>SSP selon le comité d'adjudication (mois)</b>		
Temps médian <sup>a</sup> (IC à 95 %) <sup>b</sup>	11,20 (9,66, 13,73)	7,10 (5,88, 8,48)
RR <sup>c</sup> (IC à 95 %), valeur p <sup>d</sup>	0,61 (0,49, 0,77), < 0,0001	
Données censurées, n (%)	127 (45,2)	116 (41,7)
Progression/décès, n (%)	154 (54,8)	162 (58,3)
<b>TRG selon le comité d'adjudication, n (%)</b>		
RCs	9 (3,2)	2 (0,7)
CR	35 (12,5)	9 (3,2)
TBRP	104 (37,0)	40 (14,4)
PR	83 (29,5)	88 (31,7)
MS	32 (11,4)	106 (38,1)
MP	11 (3,9)	16 (5,8)
OR (IC à 95 %) <sup>e</sup> , valeur p <sup>f</sup>	5,02 (3,35, 7,52), < 0,001	
<b>DR selon le comité d'adjudication (mois)</b>		
Temps médian <sup>a</sup> (IC à 95 %) <sup>b</sup>	13,7 (10,94, 18,10)	10,94 (8,11, 14,78)
RR <sup>c</sup> (IC à 95 %)	0,76 (0,56, 1,02)	
<b>SG (mois)</b>		
Temps médian <sup>a</sup> (IC à 95 %) <sup>b</sup>	NÉ (28,48; NÉ)	31,24 (27,01; NÉ)
RR <sup>c</sup> (IC à 95 %)	0,98 (0,73; 1,32)	
Décédé	87 (31,0)	89 (32,0)

IC = intervalle de confiance; RC = réponse complète; DR = durée de la réponse; RR = risque relatif; OR = rapport de cotes; TRG = taux de réponse globale; SG = survie globale; MP = maladie progressive; SSP = survie sans progression; RP = réponse partielle; RCs = réponse complète stricte; MS = maladie stable; NÉ = non évaluable; TBRP = très bonne réponse partielle.

<sup>a</sup> Le temps médian est établi à partir des estimations de Kaplan-Meier.

<sup>b</sup> IC à 95 % pour le temps médian.

<sup>c</sup> Selon le modèle à risques proportionnels de Cox.


<sup>d</sup> La valeur p se base sur un test log-rank stratifié.

<sup>e</sup> Le rapport de cotes est pour POMALYST® + dexaméthasone + bortézomib: dexaméthasone + bortézomib

<sup>f</sup> La valeur p est basée sur un test de CMH, stratifié en fonction de l'âge (<= 75 ans comparativement à > 75 ans), du nombre de traitements précédents contre le myélome (1 vs > 1) et du taux de bêta-2 microglobuline à la sélection (< 3,5 mg/L comparativement à ≥ 3,5 mg/L, ≤ 5,5 mg/L comparativement à > 5,5 mg/L).

Date limite de la collecte des données : 26 octobre 2017


**Figure 1 : Survie sans progression d'après l'analyse de la réponse du comité d'adjudication indépendant chargé d'évaluer la réponse selon les critères de l'IMWG (test log-rank stratifié) (population en IdT)**



Date limite de la collecte des données : 26 octobre 2017

Les analyses de sous-groupes basées sur le risque relatif pour la SSP ont été généralement comparables entre les sous-groupes préspecifiés.

Figure 2 : Graphique en forêt de la SSP (test log-rank stratifié) (population en IdT)



Chez les sujets qui avaient reçu une seule ligne de traitement précédente, la SSP médiane a été de 20,73 mois (IC à 95 % : 15,11, 27,99) dans le groupe sous POMALYST®, dexaméthasone et bortézomib et de 11,63 mois (IC à 95 % : 7,52, 15,74) dans le groupe sous dexaméthasone et bortézomib.

## **POMALYST® en association avec la dexaméthasone seule pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire**

### **Caractéristiques démographiques et plan de l'étude**

L'efficacité et l'innocuité de POMALYST® (pomalidomide) en association avec la dex ont été comparées à celles de l'HD-dex. Un traitement d'induction suivi d'une autogreffe de cellules souches et d'un traitement de consolidation/entretien était considéré comme une forme de traitement. Les patients devaient avoir reçu un traitement alkylant adéquat de l'une des façons suivantes : greffe de cellules souches ou traitement alkylant d'au moins six cycles consécutifs ou progression durant un traitement par agent alkylant, à la condition que le patient ait reçu au moins deux cycles de traitement renfermant un alkylant.

La majorité des patients étaient de sexe masculin (59 %) et de race blanche (79 %); l'âge médian de la population globale était de 64 ans (min, max : 35, 87 ans). Les patients qui présentaient une neuropathie périphérique de grade  $\geq 2$  persistante ou une dysfonction cardiaque significative ([insuffisance cardiaque congestive de classe III ou IV de la NY Heart Association], infarctus du myocarde dans les 12 mois précédant l'étude, angine de poitrine instable ou mal maîtrisée), un taux de bilirubine totale sérique  $> 2,0$  mg/dL ou une insuffisance rénale modérée ou grave (clairance de la créatinine  $< 45$  mL/min) ont été exclus de l'étude. Les caractéristiques démographiques de la population de l'étude et les caractéristiques de base de la maladie sont résumées au Tableau 13.

Les patients assignés au groupe sous POMALYST®+dexaméthasone recevaient de l'aspirine à faible dose, de l'héparine de bas poids moléculaire ou un antithrombotique ou anticoagulant équivalent, tout comme ceux qui avaient des antécédents de TVP ou d'EP, indépendamment du groupe auquel ils avaient été affectés.

Le paramètre principal de l'étude était la survie sans progression (SSP) selon les critères de l'International Myeloma Working Group (IMWG). L'étude était aussi dotée d'une puissance statistique suffisante pour démontrer un avantage sur le plan de la survie globale (SG), l'un des paramètres secondaires de l'étude.

Les patients ont continué de prendre leur traitement jusqu'à la progression de la maladie. Les patients chez qui la maladie n'a pas progressé, qui étaient intolérants au traitement ou qui ne souhaitaient plus recevoir le traitement de l'étude sont restés inscrits pour la période de suivi de la SSP prévue à la phase de traitement. Après progression de la maladie, les patients du groupe sous HD-dex avaient la possibilité de recevoir POMALYST® seul ou avec la dexaméthasone dans le cadre d'une étude connexe.

**Tableau 13 : Sommaire des caractéristiques démographiques des patients et des caractéristiques de la maladie au départ**

	<b>POMALYST®+dex (n = 302)</b>	<b>HD-dex (n = 153)</b>	<b>Ensemble (n = 455)</b>
<b>Âge (ans)</b>			
Moyen (É.-T.)	63,6 (9,33)	63,7 (9,56)	63,6 (9,40)
Médian (min, max)	64,0 (35,0, 84,0)	65,0 (35,0, 87,0)	64,0 (35,0, 87,0)
<b>Distribution selon l'âge, n (%)</b>			

**Tableau 13 : Sommaire des caractéristiques démographiques des patients et des caractéristiques de la maladie au départ (suite)**

	<b>POMALYST®+dex (n = 302)</b>	<b>HD-dex (n = 153)</b>	<b>Ensemble (n = 455)</b>
≤ 65 ans	167 (55,3)	81 (52,9)	248 (54,5)
> 65 ans	135 (44,7)	72 (47,1)	207 (45,5)
≤ 75 ans	278 (92,1)	141 (92,2)	419 (92,1)
> 75 ans	24 (7,9)	12 (7,8)	36 (7,9)
<b>Sexe, n (%)</b>			
Hommes	181 (59,9)	87 (56,9)	268 (58,9)
Femmes	121 (40,1)	66 (43,1)	187 (41,1)
<b>Stade du myélome multiple avant l'admission à l'étude, n (%)</b>			
I	21 (7,0)	12 (7,8)	33 (7,3)
II	95 (31,5)	37 (24,2)	132 (29,0)
III	177 (58,6)	103 (67,3)	280 (61,5)
Inconnu	9 (3,0)	1 (0,7)	10 (2,2)
<b>Temps écoulé après le diagnostic pathologique primaire (ans)</b>			
Moyen (É.-T.)	6,2 (4,02)	6,5 (3,63)	6,3 (3,89)
Médian (min, max)	5,3 (0,6, 30,0)	6,1 (0,9, 21,1)	5,6 (0,6, 30,0)
<b>Nombre de traitements antérieurs contre le myélome</b>			
Moyen (É.-T.)	5,1 (2,07)	5,2 (2,25)	5,1 (2,13)
Médian (min, max)	5,0 (1,0, 14,0)	5,0 (2,0, 17,0)	5,0 (1,0, 17,0)
<b>Traitements antérieurs contre le myélome, n (%)</b>			
Greffes de cellules souches	214 (70,9)	106 (69,3)	320 (70,3)
Radiothérapie	108 (35,8)	48 (31,4)	156 (34,3)
Interventions chirurgicales	25 (8,3)	17 (11,1)	42 (9,2)
<b>Réfractaire au dernier traitement contre le myélome, n (%)</b>			
	288 (95,4)	147 (96,1)	435 (95,6)
<b>Score fonctionnel ECOG, n (%)</b>			
0	110 (36,4)	36 (23,5)	146 (32,1)
1	138 (45,7)	86 (56,2)	224 (49,2)



**Tableau 13 : Sommaire des caractéristiques démographiques des patients et des caractéristiques de la maladie au départ (suite)**

	<b>POMALYST®+dex (n = 302)</b>	<b>HD-dex (n = 153)</b>	<b>Ensemble (n = 455)</b>
2	52 (17,2)	24 (16,3)	77 (16,9)
3	0 (0)	3 (2,0)	3 (0,7)
Inconnu	2 (0,7)	3 (2,0)	5 (1,1)

É.-T. = écart-type

**Tableau 14 : Exposition à un traitement antimyélome antérieur chez > 1 sujet de l'un ou l'autre des groupes par classe et terme préféré (population en IdT)**

<b>Classe/Terme préféré<sup>a</sup></b>	<b>POMALYST®+dex (n = 302)</b>	<b>HD-Dex (n = 153)</b>	<b>Ensemble (n = 455)</b>
<b>Sujets ayant reçu au moins un médicament anti-MM</b>	<b>302 (100,0)</b>	<b>153 (100,0)</b>	<b>455 (100,0)</b>
<b>Corticostéroïdes</b>	<b>302 (100,0)</b>	<b>153 (100,0)</b>	<b>455 (100,0)</b>
Dexaméthasone	294 (97,4)	152 (99,3)	446 (98,0)
Prednisolone	150 (49,7)	83 (54,2)	233 (51,2)
Méthylprednisolone	12 (4,0)	13 (8,5)	25 (5,5)
Bêtaméthasone	3 (1,0)	0 (0,0)	3 (0,7)
<b>Agents immunomodulateurs</b>	<b>301 (99,7)</b>	<b>152 (99,3)</b>	<b>453 (99,6)</b>
Lénalidomide	301 (99,7)	152 (99,3)	453 (99,6)
Thalidomide	173 (57,3)	93 (60,8)	266 (58,5)
<b>Inhibiteurs du protéasome</b>	<b>301 (99,7)</b>	<b>153 (100,0)</b>	<b>454 (99,8)</b>
Bortézomib	301 (99,7)	153 (100,0)	454 (99,8)
Carfilzomib	4 (1,3)	3 (2,0)	7 (1,5)
<b>Alkylants</b>	<b>299 (99,0)</b>	<b>150 (98,0)</b>	<b>449 (98,7)</b>
Autogreffe de cellules souches	214 (70,9)	106 (69,3)	320 (70,3)
Cyclophosphamide	214 (70,9)	110 (71,9)	324 (71,2)
Melphalan	146 (48,3)	71 (46,4)	217 (47,7)
Ifosfamide	10 (3,3)	7 (4,6)	17 (3,7)
<b>Anthracyclines</b>	<b>172 (57,0)</b>	<b>101 (66,0)</b>	<b>273 (60,0)</b>
Doxorubicine	143 (47,4)	83 (54,2)	226 (49,7)
Chlorhydrate de doxorubicine liposomique pégylé	25 (8,3)	6 (3,9)	31 (6,8)
Idarubicine	11 (3,6)	14 (9,2)	25 (5,5)

**Tableau 14 : Exposition à un traitement antitymélome antérieur chez > 1 sujet de l'un ou l'autre des groupes par classe et terme préféré (population en IdT) (suite)**

Classe/Terme préféré <sup>a</sup>	POMALYST®+dex (n = 302)	HD-Dex (n = 153)	Ensemble (n = 455)
Épirubicine	10 (3,3)	7 (4,6)	17 (3,7)
Chlorhydrate de doxorubicine liposomique	7 (2,3)	6 (3,9)	13 (2,9)
<b>Alcaloïdes</b>	<b>139 (46,0)</b>	<b>82 (53,6)</b>	<b>221 (48,6)</b>
Vincristine	109 (36,1)	70 (45,8)	179 (39,3)
Étoposide	51 (16,9)	22 (14,4)	73 (16,0)
Vindésine	0 (0,0)	3 (2,0)	3 (0,7)
<b>Nitrosurées</b>	<b>86 (28,5)</b>	<b>42 (27,5)</b>	<b>128 (28,1)</b>
Bendamustine	71 (23,5)	33 (21,6)	104 (22,9)
Carmustine	19 (6,3)	11 (7,2)	30 (6,6)
Lomustine	2 (0,7)	3 (2,0)	5 (1,1)
<b>Autres produits expérimentaux<sup>b</sup></b>	<b>59 (19,5)</b>	<b>32 (20,9)</b>	<b>91 (20,0)</b>
<b>Platine</b>	<b>35 (11,6)</b>	<b>14 (9,2)</b>	<b>49 (10,8)</b>
Cisplatine	33 (10,9)	14 (9,2)	47 (10,3)

<sup>a</sup> Les termes préférés se basent sur le dictionnaire des médicaments de l'Organisation mondiale de la santé en date de mars 2011 et sont énumérés par ordre descendant de fréquence dans le groupe sous POMALYST®+dex.

Les termes préférés ayant le même composant principal sont combinés. Seules neuf classes sont incluses dans ce tableau.

L'autogreffe de cellules souches est incluse dans la classe des alkylants.

<sup>b</sup> Cette catégorie inclut des produits non approuvés pour le MM.

Date limite de la collecte des données : le 7 sept. 2012

## Résultats de l'étude

### *Survie sans progression (SSP)*

L'analyse de la SSP par un comité d'adjudication indépendant chargé d'évaluer la réponse selon les critères de l'IMWG dans la population en intention de traiter (IdT) est présentée au Tableau 15. La courbe de Kaplan-Meier de la durée de la SSP pour la population en IdT selon l'analyse effectuée par le comité d'adjudication en fonction des critères de l'IMWG est présentée à la

Figure 3.

Le comité d'adjudication est arrivé à des résultats identiques en utilisant les critères de l'European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) dans la population en IdT.

La SSP a été évaluée pour plusieurs sous-groupes pertinents : sexe, âge, score fonctionnel ECOG, risque cytogénétique, clairance de la créatinine, taux d'albumine au départ et microglobuline. Indépendamment du sous-groupe évalué, la SSP a généralement correspondu à ce qui s'observait dans la population en IdT pour les deux groupes traités.

**Tableau 15 : Durée de la SSP selon l'analyse du comité d'adjudication et les critères de l'IMWG (population en IdT)**

	<b>POMALYST®+dex (n = 302)</b>	<b>HD-dex (n = 153)</b>
<b>SSP</b>		
Données censurées, n (%)	138 (45,7)	50 (32,7)
Progression/décès, n (%)	164 (54,3)	103 (67,3)
<b>Durée de la SSP (semaines)</b>		
Médiane <sup>a</sup>	15,7	8,0
IC à 95 % bilatéral <sup>b</sup>	[13,0 - 20,1]	[7,0 - 9,0]
Risque relatif (POMALYST®+dex : HD-dex) IC à 95 % bilatéral	0,45 [0,35 - 0,59]	
Valeur p bilatéral au test log-rank <sup>d</sup>	< 0,001	

<sup>a</sup> Le temps médian est établi à partir des estimations de Kaplan-Meier.

<sup>b</sup> Intervalle de confiance à 95 % pour la durée de la SSP médiane.


<sup>c</sup> Selon le modèle à risques proportionnels de Cox comparant les fonctions de risque associées à : groupes traités stratifiés selon l'âge ( $\leq 75$  vs  $> 75$ ), population par type de maladie (réfractaire à la lénalidomide et au bortézomib vs non réfractaire aux deux médicaments) et nombre de traitements antérieurs contre le myélome (= 2 vs  $> 2$ ).

<sup>d</sup> La valeur p est établie selon le test log-rank stratifié avec les mêmes facteurs de stratification que le modèle de Cox ci-dessus.

Noter : IC = intervalle de confiance

Date limite de la collecte des données : le 7 sept. 2012

**Figure 3 : SSP selon l'analyse de la réponse par le comité d'adjudication en fonction des critères de l'IMWG (population en IdT)**



Date limite de la collecte des données : le 7 sept. 2012

*Temps avant progression (TAP)*

Le TAP, défini comme l'intervalle entre l'assignation aléatoire et la progression de la maladie, a été mesuré aux fins d'analyse de sensibilité pour la SSP. Selon l'analyse du comité d'adjudication et les critères de l'IMWG dans la population en IdT, le TAP médian a été de 20,1 semaines (IC à 95 % : 16,1 – 28,1) dans le groupe sous POMALYST®+dexaméthasone, contre 8,3 semaines (IC à 95 % : 7,7 – 9,6) dans le groupe sous HD-dex. Le risque relatif a été de 0,42 (IC à 95 % : 0,31 – 0,56,  $p < 0,001$ ).

### Survie globale

La survie globale (SG) était un paramètre secondaire clé de l'étude et est résumée au Tableau 16 pour la population en IdT. La survie globale médiane selon l'analyse intermédiaire pour le groupe sous POMALYST®+dexaméthasone a été de 55 semaines. La SG médiane pour le groupe sous HD-dex a été de 35 semaines; toutefois, environ 29 % des sujets de ce groupe ont reçu POMALYST® après que leur maladie ait progressé en cours de traitement par HD-dex. Le taux de survie sans événement à un an a été de 51 % ( $\pm 3$  %) pour le groupe sous POMALYST®+dexaméthasone et de 39 % ( $\pm 4$  %) pour le groupe sous HD-dex.

La courbe de Kaplan-Meier pour la survie globale dans la population en IdT est illustrée à la Figure 4. La survie globale a été évaluée pour plusieurs sous-groupes pertinents : sexe, âge, score fonctionnel ECOG, risque cytogénétique, clairance de la créatinine, taux d'albumine au départ et microglobuline. Pour la plupart des sous-groupes évalués, la survie globale a généralement concordé avec celle qui s'observait dans la population en IdT pour les deux groupes.

**Tableau 16 : Survie globale (population en IdT)**

	<b>POMALYST®+dex (n = 302)</b>	<b>HD-dex (n = 153)</b>
Données censurées, n (%)	157 (52,0)	71 (46,4)
Décès, n (%)	145 (48,0)	82 (53,6)
Temps de survie médian <sup>a</sup> (semaines)	55,4	35,1
IC à 95 % bilatéral <sup>b</sup>	(45,3 - 67,3)	(29,9 - 47,1)
Risque relatif (IC à 95 % bilatéral) <sup>c</sup>	0,74 (0,56 - 0,97)	
Valeur p bilatérale par test log-rank <sup>d</sup>	0,028	

<sup>a</sup> Le temps médian est établi à partir des estimations de Kaplan-Meier.

<sup>b</sup> Intervalle de confiance à 95 % pour la durée de la SSP médiane.


<sup>c</sup> Selon le modèle à risques proportionnels de Cox comparant les fonctions de risque associées aux groupes traités.

<sup>d</sup> La valeur p se base sur un test log-rank non stratifié.

IC = intervalle de confiance

Date limite de la collecte des données : le 1er mars 2013

**Figure 4 : Courbe de Kaplan-Meier de la survie globale (population en IdT)**



Date limite de la collecte des données : le 1er mars 2013

*Taux de réponse*

Les taux de réponse selon l'analyse du comité d'adjudication et les critères de l'IMWG sont résumés au Tableau 17 pour la population en IdT. Les résultats ont concordé avec les taux de réponse observés lors de l'analyse du comité d'adjudication selon les critères de l'EBMT.

**Tableau 17 : Taux de réponse du myélome mesurés par le comité d'adjudication (selon l'évaluation de la réponse optimale à l'aide des critères de l'IMWG) (population en IdT)**

Statistiques	POMALYST®+dex (n = 302)	HD-dex (n = 153)
RC ou TBRP ou RP	50 (16,6)	6 (3,9)
Maladie stable ou MP ou NÉ <sup>a</sup>	252 (83,4)	147 (96,1)
Valeur p <sup>b</sup>	< 0,001	
Rapport des cotes (IC à 95 %) <sup>c</sup>	4,86 (2,03 - 11,61)	
Valeur p <sup>d</sup>	< 0,001	

RCs = réponse complète stricte; RC = réponse complète; TBRP = très bonne réponse partielle; RP = réponse partielle; MP = maladie progressive; NÉ = non évaluable

<sup>a</sup> Incluant les patients pour lesquels on ne disposait d'aucune donnée d'évaluation de la réponse ou dont la seule évaluation faisait état d'une réponse non évaluable.

<sup>b</sup> Probabilité selon le test exact de Fisher.

<sup>c</sup> Rapport des cotes concernant POMALYST®+dex:HD-dex. IC = intervalle de confiance.

<sup>d</sup> La valeur p se fonde sur le modèle à risques proportionnels de Cox comparant les fonctions de risque associées à : groupes traités stratifiés selon l'âge ( $\leq 75$  vs  $> 75$ ), population par type de maladie (réfractaire à la lénalidomide et au bortézomib vs non réfractaire aux deux médicaments) et nombre de traitements antérieurs contre le myélome (= 2 vs > 2).

Date limite de collecte des données : le 7 sept. 2012

## PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE

La pomalidomide agit de plusieurs façons en exerçant notamment des effets tumoricides, immunomodulateurs et anti-inflammatoires. L'activité tumoricide de la pomalidomide a été testée dans des lignées de cellules myélomateuses et témoigne d'une vaste gamme d'effets. La pomalidomide a agi en inhibant la prolifération de lignées cellulaires myélomateuses sélectionnées pour leur résistance à la dexaméthasone, au melphalan, à la doxorubicine ou à la mitoxantrone.

Dans une série d'analyses *in vitro*, la pomalidomide a exercé une puissante inhibition sur l'activité du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF- $\alpha$ ) et d'autres cytokines et chimiokines pro-inflammatoires dans des cellules mononucléaires de sang périphérique humain stimulées par des lipopolysaccharides. Certaines observations établissent un lien entre la fonction du TNF- $\alpha$  dans le micro-environnement médullaire et la promotion du MM. Le TNF- $\alpha$  déclenche la survie, la prolifération et l'activation des voies MAPK et NF- $\kappa$ B, de même que l'expression de l'anticorps BCL3 et de la molécule d'adhésion et la migration des cellules myélomateuses. Les cellules myélomateuses produisent du TNF- $\alpha$  *in vivo* et les taux de TNF- $\alpha$  sont élevés dans la moelle osseuse et le sérum des patients atteints de MM. Les polymorphismes du gène du TNF- $\alpha$  sont significativement associés à un risque accru de MM. Les cellules stromales médullaires et les cellules progénitrices du mésenchyme provenant de patients atteints de MM produisent significativement plus de TNF- $\alpha$  que les cellules prélevées chez des témoins normaux. Le TNF- $\alpha$  contribue à la formation d'ostéoclastes et les taux de TNF- $\alpha$  dans la moelle osseuse sont significativement plus élevés chez les patients atteints de MM qui souffrent de lésions ostéolytiques que chez ceux qui en sont indemnes. L'activité anti-TNF- $\alpha$  de la pomalidomide observée *in vitro* serait potentiellement liée à son mode d'action *in vivo*, par l'entremise d'une modulation de la libération des cytokines à partir des cellules pro-tumorigènes du micro-environnement.

Utilisé seul *in vivo*, la pomalidomide a inhibé la croissance de tumeurs MM1S et l'ajout de bortézomib, de dexaméthasone ou des deux ensemble a accentué davantage l'inhibition de la croissance tumorale. Dans des lymphocytes CD4 T costimulés par des anticorps monoclonaux anti-CD3, la pomalidomide a rehaussé la prolifération et accru la production d'interféron-gamma (IFN- $\gamma$ ) et d'interleukine-2 (IL-2). La pomalidomide a aussi stimulé l'activité des cellules tueuses naturelles (NK) et amélioré la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps dans des cellules tumorales ciblées, en association avec des anticorps thérapeutiques dirigés contre les antigènes de surface spécifiques à la tumeur, et il s'est révélé apte à stimuler l'expansion des lymphocytes T NK chez des patients atteints de MM. Ces analyses effectuées sur des cellules de l'immunité provenant de volontaires humains en bonne santé ont été confirmées à l'aide de cellules mononucléaires provenant du sang périphérique et de la moelle osseuse de patients atteints de MM. La pomalidomide s'est aussi révélée apte à inhiber l'angiogenèse dans des modèles tumoraux *in vitro* et *in vivo*. D'autres études démontrent aussi que la pomalidomide est cytotoxique dans des lignées cellulaires rendues résistantes à la lénalidomide. L'association pomalidomide + dexaméthasone exerce un effet synergique dans l'inhibition de la prolifération cellulaire et l'induction de l'apoptose dans des lignées cellulaires sensibles et résistantes au lénalidomide. La synergie entre la pomalidomide et la dexaméthasone a aussi été notée *in vivo* dans un modèle de xénogreffe de myélome à plasmocytes humains H929 réfractaire à la lénalidomide.

## **Pharmacologie humaine**

### **Possibilité que POMALYST® ait un effet sur l'action d'autres médicaments :**

*In vitro*, la pomalidomide n'exerce pas d'inhibition sur les enzymes CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ou CYP3A4/5. En outre, *in vitro*, la pomalidomide n'induit pas les enzymes CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 ou CYP3A4/5.

La pomalidomide n'est pas un inhibiteur de la glycoprotéine P et exerce un effet inhibiteur faible, voire nul, sur la protéine de résistance du cancer du sein (BCRP), les protéines de transport d'anions organiques (OATP)1B1 et OATP1B3, les transporteurs d'anions organiques OAT1 et OAT3 et le transporteur de cations organiques OCT2, selon des études *in vitro*.

On ne s'attend pas à ce que la pomalidomide provoque des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques cliniquement significatives en raison de l'inhibition ou de l'induction d'enzymes ou de l'inhibition de molécules de transport lors de sa coadministration avec des substrats de ces enzymes ou transporteurs. Le risque de survenue de telles interactions médicamenteuses, y compris l'impact potentiel de la pomalidomide sur l'exposition aux contraceptifs oraux n'a pas fait l'objet d'une évaluation clinique.

### **Effet d'autres produits médicinaux sur POMALYST® :**

La pomalidomide est partiellement métabolisée par les enzymes CYP1A2 et CYP3A4. Il est également un substrat de la glycoprotéine P. La coadministration de la pomalidomide avec le puissant inhibiteur du CYP3A4/5 et de la glycoprotéine P kétoconazole ou le puissant inducteur du CYP3A4/5 carbamazépine, n'a eu aucun effet cliniquement pertinent sur l'exposition au pomalidomide. La coadministration de la pomalidomide avec le puissant inhibiteur du CYP1A2 fluvoxamine a fait augmenter l'exposition à la pomalidomide. Il faut réduire la dose de POMALYST® de 50 % si elle est coadministrée avec un puissant inhibiteur du CYP1A2.

La coadministration de doses multiples allant jusqu'à 4 mg de pomalidomide avec 20 à 40 mg de dexaméthasone (un inducteur faible à modéré de plusieurs enzymes du CYP y compris le CYP3A) à des patients atteints de myélome multiple n'a exercé aucun effet sur la pharmacocinétique de la pomalidomide comparativement à ce dernier administré seul.

## **TOXICOLOGIE**

<b>Titre de l'étude</b>	<b>Observations</b>
Toxicologie générale Étude de toxicité de six mois sur la pomalidomide administrée par gavage oral à des rats, avec période de récupération d'un mois	Chez les rats, l'administration prolongée de pomalidomide à des doses de 50, 250 et 1 000 mg/kg/jour pendant six mois a été bien tolérée. On n'a noté aucune réaction indésirable avec une dose allant jusqu'à 1 000 mg/kg/jour (175 fois l'exposition par rapport à une dose clinique de 4 mg).



<p>Toxicologie générale</p> <p>Étude de toxicité orale de neuf mois sur la pomalidomide administrée par gavage nasogastrique à des singes macaques, avec période de récupération de huit semaines</p>	<p>Chez les singes, la pomalidomide a fait l'objet d'études sur l'administration de doses répétées pendant une durée allant jusqu'à neuf mois. Lors de ces études, les singes ont manifesté une plus grande sensibilité aux effets de la pomalidomide comparativement aux rats. Les principales toxicités observées chez les singes ont été associées aux systèmes hématopoïétique/lymphoréticulaire. Dans l'étude de neuf mois chez les singes sur des doses de 0,05, 0,1 et 1 mg/kg/jour, la morbidité et l'euthanasie précoce ont été notées chez six animaux à la dose de 1 mg/kg/jour et ont été attribuées à des effets immunosuppresseurs (infection staphylococcique, baisse des lymphocytes du sang périphérique, inflammation chronique du côlon, déplétion lymphoïde des tissus lymphoïdes et hypocellularité lymphoïde de la moelle osseuse) lors de fortes expositions à la pomalidomide (exposition 15 fois supérieure par rapport à une dose clinique de 4 mg). Ces effets immunosuppresseurs ont entraîné l'euthanasie précoce de quatre singes en raison d'un piètre état de santé (selles liquides, inappétence, réduction de l'apport alimentaire et perte de poids); à l'examen histopathologique, ces animaux se sont révélés porteurs d'une inflammation chronique du côlon et d'une atrophie villositaire du grêle. On a observé une infection staphylococcique chez quatre singes; trois de ces animaux ont répondu à l'antibiothérapie et un est décédé sans traitement. En outre, des observations concordant avec une leucémie myélogène aiguë ont entraîné l'euthanasie d'un singe. Les observations cliniques et les signes anatomopathologiques cliniques et/ou les altérations médullaires observées chez cet animal concordent avec l'immunosuppression. Une prolifération minime ou légère de l'épithélium du cholédoque, accompagnée d'augmentations de la phosphatase alcaline et de la gamma-glutamine-transférase, a aussi été observée avec la dose de 1 mg/kg/jour. L'examen des animaux après la période de récupération a indiqué que tous les signes associés au traitement étaient réversibles huit semaines après son arrêt, sauf en ce qui a trait à la prolifération de l'épithélium du cholédoque intrahépatique observée chez un animal du groupe soumis à 1 mg/kg/jour. La dose sans effet toxique (DSET) était de 0,1 mg/kg/jour (0,5 fois l'exposition par rapport à une dose clinique de 4 mg). En général, on a constaté des observations similaires lors d'études de durée plus brève chez des singes, qui portaient sur des niveaux de dose/d'exposition plus élevés et qui ont aussi entraîné une baisse des numérations de neutrophiles du sang périphérique et parfois une baisse des paramètres érythroïdes.</p>
---	---

<p>Toxicologie reproductive</p> <p>Étude de fertilité et de développement embryonnaire précoce chez des rats traités par pomalidomide par voie orale</p>	<p>Dans une étude sur la fertilité et le début du développement embryonnaire chez des rats, la pomalidomide a été administrée à des rats mâles et femelles à raison de 25, 250 et 1 000 mg/kg/jour avant, durant et après la saillie entre animaux qui recevaient la même dose. L'examen de l'utérus au Jour 13 de la gestation a révélé une baisse du nombre d'embryons viables et une augmentation des pertes post-implantation à tous les niveaux de dose. Par conséquent, la dose sans effet toxique (DSET) pour ces effets a été &lt; 25 mg/kg/jour (l'ASC de 24 h était de 39 960 ng•h/mL) à cette dose inférieure testée et l'exposition était 99 fois plus élevée qu'une dose clinique de 4 mg). Dans cette étude, lorsque les mâles traités se sont accouplés avec des femelles non traitées, tous les paramètres utérins étaient comparables à ceux des témoins. Ces résultats indiquent que les effets observés ont été attribués au traitement administré aux femelles.</p>
<p>Toxicologie développementale</p> <p>Étude de développement embryofœtal chez des rats traités par pomalidomide par voie orale</p>	<p>La pomalidomide s'est révélée tératogène chez les rats à qui on l'a administrée pendant la principale période d'organogenèse. Dans l'étude de toxicité du développement embryofœtal chez des rats, on a observé les malformations suivantes à tous les niveaux de dose (25, 250 et 1 000 mg/kg/jour) : malformations ou absence de vessie, absence de glande thyroïde et fusion ou désalignement des éléments vertébraux lombaires et thoraciques (arcs centraux et/ou neurax) parfois associés à des côtes discontinues ou déformées.</p> <p>On n'a observé aucune toxicité maternelle au cours de cette étude. Par conséquent, la DSET maternelle a été de 1 000 mg/kg/jour et la DSET pour la toxicité développementale a été &lt; 25 mg/kg/jour (l'ASC de 24 h a été de 34 340 ng•h/mL au Jour 17 de la gestation à cette dose inférieure testée et l'exposition équivalait à 85 fois la dose clinique de 4 mg).</p>

<p>Toxicologie développementale</p> <p>Étude de toxicologie développementale par voie orale (tube gastrique) sur la pomalidomide chez des lapins</p>	<p>La pomalidomide s'est révélée tératogène chez des lapins à qui on l'a administrée pendant la principale période d'organogenèse. Chez les lapins, la pomalidomide à des doses allant de 10 à 250 mg/kg a donné lieu à des malformations et des variations du développement embryofœtal. On a observé des anomalies cardiaques (communication interventriculaire) et des malformations du squelette (vertèbres caudales) plus nombreuses à tous les niveaux de dose. Avec les doses de 100 et de 250 mg/kg/jour, on a noté de légères augmentations des pertes post-implantation et de légères diminutions du poids corporel fœtal. Avec les doses de 100 et/ou de 250 mg/kg/jour, les malformations fœtales ont également inclus des anomalies des membres (fléchissement et/ou rotation des pattes de devant et/ou de derrière, doigts non fixés ou absents) et des malformations du squelette (métacarpes non ossifiés, phalanges et métacarpes non alignés, phalanges non ossifiées et tibias courts non ossifiés ou courbés), dilatation modérée du ventricule latéral cérébral, positionnement anormal de la sous-clavière droite, absence du lobe intermédiaire des poumons, rein bas, altération de la morphologie du foie, ossification incomplète ou absence de l'os du bassin, augmentation du nombre moyen de côtes thoraciques surnuméraires et réduction de l'ossification moyenne des tarses. On a observé une légère réduction du gain pondéral maternel, une réduction significative des triglycérides et une baisse significative du poids absolu et relatif des rates avec les doses de 100 et de 250 mg/kg/jour. La DSET maternelle a été de 10 mg/kg/jour et la DSET développementale a été &lt; 10 mg/kg/jour. L'ASC de 24 h a été de 418 ng•h/mL au Jour 19 de la gestation à cette dose, la plus basse testée, ce qui s'est révélé similaire à ce qui s'observe avec la dose clinique de 4 mg. La thalidomide a servi de substance témoin positive dans le cadre de l'étude et a donné lieu à bon nombre d'observations similaires par rapport à la pomalidomide.</p>
<p>Cancérogénicité</p>	<p>Un singe sur douze ayant reçu 1 mg/kg de pomalidomide (une exposition correspondant à environ 15 fois l'exposition chez les patients à la dose recommandée de 4 mg/jour) a présenté une leucémie myéloïde aiguë lors d'une étude de toxicologie de neuf mois sur des doses répétées.</p>
<p>Mutagenicité/génotoxicité</p> <p>Évaluation de la pomalidomide lors de tests de mutation inverse bactérienne avec test de confirmation</p> <p>Évaluation de la pomalidomide lors de tests d'aberrations</p>	<p>La pomalidomide ne s'est pas révélée mutagène lors de tests d'Ames de mutation bactérienne et mammalienne et elle n'a pas induit d'aberrations chromosomiques dans les lymphocytes du sang périphérique humain in vitro, ni la formation de micronoyaux dans des érythrocytes polychromatiques de moelle osseuse de rats à qui l'on avait administré des doses allant jusqu'à 2 000 mg/kg/jour.</p>

<p>chromosomiques sur des lymphocytes de sang périphérique humain mis en culture</p> <p>Évaluation de la pomalidomide dans le test du micronoyau sur des cellules de la moelle osseuse de rats <i>in vivo</i></p>	
<p>Immunotoxicité</p> <p>Étude d'immunotoxicité de 28 jours sur pomalidomide administrée par gavage nasogastrique à des singes macaques, suivie d'une période de récupération de 30 jours</p>	<p>L'administration orale de pomalidomide à 2 mg/kg/jour pendant 28 jours a nui aux réponses immunitaires humorales primaires et secondaires (atténuation de la production d'anticorps IgM et IgG anti-KLH) et a entraîné des baisses légères à modérées des lymphocytes périphériques circulants (lymphocytes B CD20+, lymphocytes T CD3+, lymphocytes T auxiliaires CD3+/CD4+, lymphocytes T cytotoxiques CD3+/CD8+, cellules NK CD3-/CD16+ et monocytes CD3-/CD14+), en corrélation avec une hypocellularité légère à modérée des lymphocytes médullaires, de même qu'une déplétion lymphoïde marquée du thymus, de la rate (incluant lympholyse et/ou cellularité accrue de la pulpe rouge) et des ganglions lymphatiques mandibulaires et mésentériques. On n'a noté aucun effet sur le fonctionnement des granulocytes, des monocytes et des cellules NK. Un mâle a été euthanasié en raison d'un piètre état clinique. Les signes cliniques et anatomopathologiques observés se sont révélés réversibles.</p>

## RÉFÉRENCES

1. Bjorklund CC, Lu L, Kang J, Hagner PR, Havens CG, Amatengelo M, et coll., Rate of CRL4 (CRBN) substrate Ikaros and Aiolos degradation underlies differential activity of lenalidomide and pomalidomide in multiple myeloma cells by regulation of c-Myc and IRF4. *Blood Cancer J.* 2015;5:e354.
2. Gandhi AK, Kang J, Havens CG, Conklin T, Ning Y, Wu L, et coll., Immunomodulatory agents lenalidomide and pomalidomide co-stimulate T cells by inducing degradation of T cell repressors ikaros and aiolos via modulation of the E3 ubiquitin ligase complex CRL4(CRBN). *Br J Haematol* 2014;164(6):811-821.
3. Gorgun G, Calabrese E, Soydan E et coll., Immunomodulatory effects of lenalidomide and pomalidomide on interaction of tumor and bone marrow accessory cells in multiple myeloma. *Blood* 2010;116(17):3227-37.
4. Hayashi T, Hideshima T, Akiyama M et coll., Molecular mechanisms whereby immunomodulatory drugs activate natural killer cells clinical application. *Br J Haematol* 2005;128(2):192-203.

5. Krönke J, Udeshi ND, Narla A, Grauman P, Hurst SN, McConkey M, et coll., Lenalidomide causes selective degradation of IKZF1 and IKZF3 in multiple myeloma cells. *Science*. 2014;343(6168):301-5.
6. Kyle RA, Rajkumar SV. Criteria for diagnosis, staging, risk stratification and response assessment of multiple myeloma. *Leukemia* 2009;23(1):3-9.
7. Lacy MQ, Allred JB, Gertz MA, Hayman SR, Short KD, Buadi F et coll., Pomalidomide plus low dose dexamethasone in myeloma refractory to both bortezomib and lenalidomide: Comparison of 2 dosing strategies in dual-refractory disease. *Blood* 2011;118(11):2970-2975.
8. Lacy MQ, Hayman SR, Gertz MA, Dispenzieri A, Buadi F, Kumar S et coll., Pomalidomide (CC 4047) plus low-dose dexamethasone as therapy for relapsed multiple myeloma. *J Clin Oncol* 2009;27(30):5008-5014.
9. Lacy MQ, Hayman SR, Gertz MA, Short KD, Dispenzieri A, Kumar S et coll., Pomalidomide (CC-4047) plus low dose dexamethasone (pom/dex) is active and well tolerated in lenalidomide refractory multiple myeloma (mm). *Leukemia* 2010;24(11):1934-1939.
10. Lentzsch S, LeBlanc R, Podar K et coll., Immunomodulatory analogs of thalidomide inhibit growth of Hs Sultan cells and angiogenesis in vivo. *Leukemia* 2003;17(1):41-4.
11. Lopez-Girona A, Mendy D, Ito T, Miller K, Gandhi AK, Kang J, et coll., Cereblon is a direct protein target for immunomodulatory and antiproliferative activities of lenalidomide and pomalidomide. *Leukemia*. 2012;26(11):2326-2335.
12. Lu L, Payvandi F, Wu L, Zhang LH, Hariri RJ, Man HW, et coll., The anti-cancer drug lenalidomide inhibits angiogenesis and metastasis via multiple inhibitory effects on endothelial cell function in normoxic and hypoxic conditions. *Microvasc Res* 2009;77(2):78-86.
13. Lu G, Middleton RE, Sun H, Naniong M, Ott CJ, Mitsiades CS, et coll., The myeloma drug lenalidomide promotes the cereblon-dependent destruction of Ikaros proteins. *Science*. 2014;343(6168):305-9.
14. Mitsiades N, Mitsiades CS, Poulaki V, Chauhan D, Richardson PG, Hideshima T, et coll., Apoptotic signaling induced by immunomodulatory thalidomide analogs in human multiple myeloma cells: therapeutic implications. *Blood* 2002;99(12):4525-4530.
15. Reddy N, Hernandez-Ilizaliturri FJ, Deeb G, Roth M, Vaughn M, Knight J et coll., Immunomodulatory drugs stimulate natural killer-cell function, alter cytokine production by dendritic cells, and inhibit angiogenesis enhancing the anti-tumour activity of rituximab in vivo. *Br J Haematol* 2008;140(1):36-45.
16. San Miguel J et coll., Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with relapsed and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomized, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2013; 14: 1055-66.
17. Sehgal K, Das R, Zhang L, Verman R, Deng Y, Kocoglu M, et coll., Clinical and pharmacodynamic analysis of pomalidomide dosing strategies in myeloma: impact of immune activation and cereblon targets. *Blood* 2015;125(26):4042-4051.

18. Schey SA, Fields P, Bartlett JB, Clarke IA, Ashan G, Knight RD, et coll., Phase I study of an immunomodulatory thalidomide analog, cc-4047, in relapsed or refractory multiple myeloma. *J Clin Oncol* 2004;22(16):3269-3276
19. Zhu YX, Braggio E, Shi CX, Bruins LA, Schmidt JE, Van Wier S, et coll., Cereblon expression is required for the antimyeloma activity of lenalidomide and pomalidomide. *Blood* 2011;118(18):4771-4779.

**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**

**P<sup>r</sup>POMALYST<sup>®</sup>  
pomalidomide**

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée à la suite de l'approbation de la vente de POMALYST<sup>®</sup> au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de POMALYST<sup>®</sup>. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

POMALYST<sup>®</sup> ne peut être administré qu'aux patients inscrits au programme RevAid<sup>®</sup> et qui répondent à toutes ses exigences. RevAid<sup>®</sup> est un programme de distribution contrôlée de POMALYST<sup>®</sup>.

**Les raisons d'utiliser ce médicament :**

POMALYST<sup>®</sup> est utilisé pour traiter les adultes atteints de myélome multiple. Il s'agit d'un cancer des plasmocytes (un type de globule blanc qu'on trouve dans la moelle osseuse).

POMALYST<sup>®</sup> est soit utilisé avec

- la dexaméthasone et le bortézomib pour les patients :
  - qui ont déjà reçu au moins une forme de traitement incluant la lénalidomide, et
  - dont la maladie s'est aggravée lors du plus récent traitement.

**Ou**

- la dexaméthasone pour les patients dont la maladie s'est aggravée après au moins deux autres traitements incluant la lénalidomide et du bortézomib.

**Les effets de ce médicament :**

POMALYST<sup>®</sup> agit dans la moelle osseuse. Il stimule le système immunitaire pour qu'il attaque la croissance des cellules de myélome cancéreuses. POMALYST<sup>®</sup> peut aussi ralentir la croissance des cellules cancéreuses.

Lorsqu'il est utilisé avec de la dexaméthasone et/ou du bortézomib, POMALYST<sup>®</sup> peut empêcher le myélome multiple de s'aggraver.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :**

Ne prenez pas POMALYST<sup>®</sup> si :

- Vous êtes enceinte
- Vous pourriez devenir enceinte
- Vous devenez enceinte pendant le traitement par POMALYST<sup>®</sup>
- Vous allaitez

- Vous êtes un patient de sexe masculin et êtes incapable de suivre ou respecter les mesures contraceptives du programme RevAid<sup>®</sup>
- Vous êtes allergique à la pomalidomide, à la lénalidomide ou à la thalidomide ou à l'un des autres ingrédients de POMALYST<sup>®</sup>

**Les patientes qui pourraient devenir enceintes ne doivent pas prendre POMALYST<sup>®</sup> à moins que toutes les conditions du programme RevAid<sup>®</sup> ne soient respectées.**

**L'ingrédient médicamenteux est :**

Pomalidomide

**Les ingrédients non médicamenteux importants sont :**

Chaque capsule renferme du mannitol, de l'amidon pré-gélatinisé et du stéaryl fumarate de sodium. La composition additionnelle des différentes teneurs des capsules est fournie dans le tableau ci-dessous.

Teneur	Inscription	Composition	Couleur	Taille de l'emballage
1 mg	POML 1 mg	Gélatine, dioxyde de titane, carmin d'indigo, oxyde de fer jaune	Bleu foncé opaque et jaune opaque	Emballage s thermofor més de 21 capsules
2 mg	POML 2 mg	Gélatine, dioxyde de titane, carmin d'indigo, oxyde de fer jaune, rouge n° 3 (FD&C)	Bleu foncé opaque et orange opaque	Emballage s thermofor més de 21 capsules
3 mg	POML 3 mg	Gélatine, dioxyde de titane, carmin d'indigo, oxyde de fer jaune	Bleu foncé opaque et vert opaque	Emballage s thermofor més de 21 capsules
4 mg	POML 4 mg	Gélatine, dioxyde de titane, bleu brillant FCF, carmin d'indigo	Bleu foncé opaque et bleu opaque	Emballage s thermofor més de 21 capsules

**Les formes posologiques sont :**

Capsules. Chaque capsule renferme 1 mg, 2 mg, 3 mg ou 4 mg de pomalidomide.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

**Mises en garde et précautions importantes**

**POMALYST® ne doit être prescrit que par un médecin qui connaît bien l'utilisation des médicaments anticancéreux et qui est inscrit au programme de distribution contrôlée RevAid®.**

**Des effets secondaires graves peuvent survenir lors de l'utilisation de POMALYST® et pourraient inclure :**

- **anomalies congénitales (déformations chez le bébé) ou décès du bébé à naître et avortement spontané**
- **diminution de la production des cellules sanguines qui donne lieu à des taux très faibles de globules blancs (neutropénie) et de plaquettes (thrombocytopenie)**
- **infections pouvant être mortelles**
- **caillots sanguins dans les veines (thrombose veineuse profonde) et dans les poumons (embolie pulmonaire)**
- **problèmes de foie. Le traitement par POMALYST® peut entraîner un risque plus élevé de problèmes de foie potentiellement fatals.**
- **réaction allergique grave appelée anaphylaxie**
- **réactivation de l'hépatite B.** Survient quand une ancienne infection virale du foie redevient active. Cela peut être mortel.
- **réactions cutanées graves pouvant être mortelles.** Elles peuvent comprendre le syndrome de Stevens-Johnson, le syndrome de Lyell et le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS).
- **Syndrome de lyse tumorale.** Il est causé par la dégradation rapide des cellules cancéreuses. Elles libèrent alors leur contenu, ce qui entraîne une augmentation ou une diminution des taux sanguins de certaines autres substances chimiques.

**POMALYST® n'est accessible qu'en vertu d'un programme de distribution contrôlée appelé RevAid®.**

**Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser POMALYST® si :**

- Vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir
- Vous allaitez
- Vous souffrez de problèmes hématologiques
- Vous souffrez ou avez souffert de problèmes cardiaques (crise cardiaque ou battements cardiaques irréguliers)
- Vous fumez, vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'hypercholestérolémie
- Vous avez déjà présenté une réaction allergique, telle que : éruptions cutanées, démangeaisons, enflure, étourdissements ou gêne respiratoire pendant que vous preniez des médicaments apparentés comme la « thalidomide » ou la « lénalidomide ».
- Vous avez déjà présenté une hépatite B.

D'autres cancers ont été signalés pendant le traitement avec la pomalidomide (l'ingrédient actif dans POMALYST®). Votre professionnel de la santé surveillera les signes de certains cancers qui pourraient survenir chez vous.

**POMALYST® peut provoquer des anomalies congénitales. Pour pouvoir prendre ce médicament, vous devez répondre aux conditions suivantes :**

**1. Femmes fertiles :**

- Discutez de contraception avec votre professionnel de la santé.
- Utilisez simultanément au moins deux méthodes de contraception efficaces.
- Utilisez ces deux méthodes de contraception efficaces :
  - Pendant au moins quatre semaines avant le début du traitement par POMALYST®
  - Pendant les interruptions du traitement par POMALYST®
  - Pendant le traitement par POMALYST®
  - Pendant au moins quatre semaines après l'arrêt du traitement par POMALYST®
- Vous devez avoir deux tests de grossesse négatifs avant de commencer le traitement :
  - Le premier, 7 à 14 jours avant de commencer le traitement
  - Le second, dans les 24 heures précédant le début du traitement.
- Vous devez avoir des tests de grossesse négatifs pendant le traitement :
  - Une fois par semaine pendant les quatre premières semaines
  - Une fois toutes les quatre semaines (ou toutes les deux semaines si vos



menstruations sont irrégulières)  
pendant la durée du traitement et  
durant les interruptions de traitement

- Vous devez subir un test de grossesse final quatre semaines après avoir cessé POMALYST®.

**Toute méthode contraceptive peut échouer. Communiquez avec votre médecin immédiatement si vous croyez que vous êtes enceinte. Assurez-vous également de communiquer avec votre médecin si vous n'avez pas vos règles ou si vous présentez des saignements menstruels anormaux.**

## 2. Hommes :

- POMALYST® est présent dans le sperme des hommes qui prennent ce médicament. Utilisez un condom chaque fois que vous avez un rapport sexuel avec une femme enceinte ou fertile. Cette mesure est obligatoire, même si vous avez subi avec succès une vasectomie. Le condom doit être utilisé :
  - pendant votre traitement par POMALYST®
  - pendant les interruptions de traitement
  - pendant quatre semaines après avoir cessé le traitement par POMALYST®
- Ne faites pas de dons de sperme pendant que vous prenez POMALYST® et pendant quatre semaines après l'arrêt de POMALYST®.
- Informez vos partenaires sexuelles fertiles que :
  - vous prenez POMALYST®
  - il y a un risque d'anomalies congénitales, de mortinatalité et d'avortement spontané si un fœtus est exposé à votre sperme.
  - vous devez utiliser un condom.

**Communiquez immédiatement avec votre médecin si vous croyez que votre partenaire sexuelle est tombée enceinte pendant que vous preniez POMALYST®.**

## 3. Tous les patients :

- Ne faites pas de dons de sang pendant que vous prenez POMALYST® et pendant au moins quatre semaines après l'arrêt de POMALYST®.
- Ne partagez POMALYST® avec personne.
- Ne prenez pas POMALYST® si vous n'êtes pas inscrit au programme de distribution contrôlée RevAid® ou si vous ne répondez pas à ses critères d'admissibilité.

POMALYST® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 18 ans.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Attendez de savoir comment vous réagissez à POMALYST® avant d'effectuer des tâches qui peuvent exiger une attention particulière. Si vous vous sentez étourdi ou fatigué, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux qui sont prescrits et qui sont en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes médicinales. Il est possible que POMALYST® et d'autres médicaments interagissent et provoquent des effets secondaires graves.

Les médicaments qui peuvent interagir avec POMALYST® incluent : la fluvoxamine, l'hormonothérapie substitutive et les contraceptifs hormonaux (œstrogènes et progestatifs).

POMALYST® peut causer de la confusion, de la fatigue, une altération de l'état de conscience et des étourdissements. Ne conduisez pas et ne faites pas fonctionner de machinerie tant que vous ne saurez pas l'effet que POMALYST® a sur vous.

Le tabagisme peut rendre le traitement par POMALYST® moins efficace.

Sachez quels médicaments vous prenez. Conservez-en une liste pour la montrer à votre professionnel de la santé et à votre pharmacien.

## UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Prenez POMALYST® exactement comme prescrit.

Avalez les capsules entières avec de l'eau, une fois par jour. Prenez votre dose environ au même moment chaque jour.

Il ne faut pas couper, mâcher ni ouvrir les capsules.

Si vous éprouvez des problèmes rénaux et que vous êtes hémodialysé, prenez POMALYST® après votre traitement d'hémodialyse, les jours d'hémodialyse.

## Dose habituelle :

**Dose de départ de POMALYST® en association avec la dexaméthasone et le bortézomib :** 4 mg par la bouche une fois par jour, aux jours 1 à 14 de chaque cycle de 21 jours.

**Dose de départ de POMALYST® en association avec la dexaméthasone seule :** 4 mg par la bouche une fois par jour, aux jours 1 à 21 de chaque cycle de 28 jours.

Votre dose initiale de POMALYST® pourrait être différente. Ce sera le cas si :

- vous souffrez de problèmes de foie; ou
- vous souffrez de problèmes rénaux et que vous recevez une hémodialyse; ou
- vous prenez certains médicaments.

Votre médecin peut modifier votre dose en cours de traitement. Il fixera aussi la durée totale du traitement qu'il vous faut. Cela dépendra de votre réponse au traitement.

Les femmes fertiles ou qui prévoient devenir enceintes doivent porter des gants de latex pour manipuler les capsules de POMALYST®. Toute personne vous aidant à prendre le médicament doit s'en souvenir.

Vous devrez subir régulièrement des analyses sanguines pendant votre traitement par POMALYST®. Des analyses seront effectuées sur votre sang toutes les semaines durant les 8 premières semaines de traitement, et au moins une fois par mois par la suite. Votre professionnel de la santé pourrait modifier votre dose de POMALYST® ou suspendre votre traitement selon les résultats de ces analyses et la façon dont vous vous sentez.

**Surdose :**

En cas de surdosage, communiquer immédiatement avec un professionnel de la santé, l'urgence d'un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

**Dose oubliée :**

Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis la dose omise, prenez la dose. Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis la dose omise à l'heure prévue, ne prenez pas la dose. Prenez la dose suivante à l'heure prévue le lendemain. Ne prenez pas deux doses à la fois.

**PROCÉDURES A SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES**

Comme tous les médicaments, POMALYST® peut causer des effets secondaires. En prenant POMALYST, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si vous manifestez un effet secondaire qui n'est pas mentionné ici ou un effet secondaire qui vous ennuie ou qui ne disparaît pas, informez-en votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires incluent :

- fatigue
- éruptions cutanées, démangeaisons
- fièvre
- grippe (influenza), infections du nez, de la gorge et des sinus
- enflure des bras ou des jambes
- altération du sens du goût (dysgueusie)
- inflammation de la bouche et des lèvres (stomatite)
- diarrhée, nausées, constipation, vomissements, perte d'appétit, indigestion (dyspepsie), ballonnement (distension abdominale)
- perte de poids
- douleur abdominale, douleur pelvienne, maux de dos, douleur à la poitrine, spasmes musculaires
- chutes
- difficulté à respirer/essoufflement (dyspnée)
- toux
- étourdissements
- maux de tête
- tremblements
- trouble du sommeil

POMALYST peut provoquer des résultats anormaux lors des analyses sanguines. Votre professionnel de la santé décidera du moment pour effectuer des analyses sanguines et interprétera les résultats.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE**

Symptôme/effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou votre pharmacien
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Très fréquent	<b>Neuropathie périphérique</b> : engourdissement ou picotement dans les pieds ou les mains	✓	
	<b>Neutropénie, septicémie neutropénique, leucopénie, lymphopénie (faibles taux de globules blancs)</b> : frissons, fièvre, transpiration, tout signe d'infection	✓	
	<b>Anémie (faible taux de globules rouges)</b> : lassitude, peau pâle, essoufflement, faiblesse	✓	
	<b>Thrombocytopénie (faible taux de plaquettes dans le sang)</b> : saignement des gencives ou sites de saignement anormaux, tendance aux bleus	✓	
	<b>Infections, y compris infections pulmonaires, pneumonie, bronchite, pneumonie bronchique</b> : fièvre, frissons, fatigue, toux, essoufflement, toussotement de mucus épais jaune ou vert, rythme cardiaque rapide; <b>infection urinaire</b> : besoin d'uriner fréquemment, sensation de brûlure ou de douleur en urinant, urine trouble	✓	
Fréquents	<b>Douleurs osseuses</b>	✓	
	<b>Thromboembolie veineuse, y compris thrombose veineuse profonde (caillot de sang dans un vaisseau sanguin)</b> : douleur accompagnée d'une enflure et d'une rougeur des bras ou des jambes; <b>embolie pulmonaire (caillot de sang dans les poumons)</b> : essoufflement, douleur		✓

Symptôme/effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou votre pharmacien
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Fréquents	subite à la poitrine ou gêne respiratoire		
	<b>Confusion</b>		✓
	<b>Rétention urinaire</b> : difficulté à uriner	✓	
	<b>Altération du niveau de conscience</b> : altération de l'état mental		✓
	<b>Vertiges</b> : étourdissements, sensation de tête qui tourne	✓	
	<b>Cataractes</b> : voilement du cristallin, vue trouble ou réduite, douleur aux yeux		✓
	<b>Dépression</b> : sentiment de tristesse		✓
	<b>Insuffisance rénale</b> : peu d'urine, essoufflement, confusion		✓
	<b>Hypotension (pression artérielle basse)</b> : vertiges, étourdissements ou évanouissements		✓
	<b>Hypertension (pression artérielle élevée)</b> : maux de tête, essoufflement		✓
Rares	<b>Syndrome de lyse tumorale</b> (mort rapide et soudaine des cellules cancéreuses en raison du traitement) : nausée, essoufflement, rythme cardiaque irrégulier, peu d'urine, urine trouble, grande faiblesse musculaire, convulsions		✓
	<b>Réactions allergiques (réactions anaphylactiques, œdème angioneurotique, urticaire)</b> : enflure rapide du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge; difficulté à respirer ou avaler et boursoufflures cutanées rouges et qui démangent		✓
	<b>Graves réactions dermatologiques, incluant le syndrome de Stevens-Johnson ou le syndrome de Lyell (réactions cutanées rares)</b> : desquamation ou boursoufflures, changements d'apparence de votre peau		✓

Symptôme/effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou votre pharmacien
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Rares	<b>Hépatite / réactivation de l'hépatite (inflammation du foie)</b> : démangeaisons cutanées, teinte jaune de la peau et du blanc des yeux, selles pâles, urine foncée, douleurs abdominales		✓
		<b>Maladie pulmonaire ou inflammation pulmonaire (pneumonie)</b> : essoufflement, toux sèche, fatigue	
Très rares	<b>Carcinomes basocellulaire et épidermoïde</b> (certains types de cancer) : changements d'apparence de votre peau ou excroissances cutanées		✓
Inconnu	<b>Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS pour drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms; réaction rare à certains médicaments)</b> : symptômes pseudogrippaux, érythème au visage qui peut s'étendre à tout le corps, fièvre		✓

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti à la suite de la prise de POMALYST®, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Conservez POMALYST® entre 15 °C et 30 °C. Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

**DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES  
SOUÇONNÉS**

**Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des trois façons suivantes :**

- **En ligne <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>**
- **Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1 866 234-2345**
- **En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :**
  - **par télécopieur, au numéro sans frais 1 866 678-6789 ou**
  - **par la poste au :**

**Programme Canada Vigilance  
Santé Canada  
Indice postal 1908C  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K9**

**Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet<sup>MC</sup> Canada, à l'adresse <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>**

***REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.***

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Les renseignements contenus dans ce document sont à jour en date de la dernière révision indiquée ci-dessous. On peut trouver les renseignements les plus à jour à l'adresse : [www.RevAid.ca](http://www.RevAid.ca), en communiquant avec le promoteur, Celgene, au : 1 888 RevAid1 (1 888 738-2431) ou en se rendant à l'adresse [www.celgenecanada.net](http://www.celgenecanada.net).

Ce feuillet a été préparé par Celgene Inc.

© 2019 Celgene Corporation.

®POMALYST est une marque déposée de Celgene Corporation.

®REVAID est une marque déposée de Celgene Corporation.

Date de la dernière révision : 21 août 2019